

全国 2014 年 10 月高等教育自学考试

护理学基础试题

课程代码:02997

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共 34 小题,每小题 1 分,共 34 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 影响健康的心理精神因素是

- A. 传统习惯 B. 自我概念 C. 人际关系 D. 生活水平

2. 罗依模式的重点在于

- A. 人的适应性 B. 无效性反应对健康的影响
C. 环境中对人产生影响的三种刺激 D. 人在适应过程中的应对机制

3. 使瞳孔缩小的药物是

- A. 阿托品 B. 肾上腺素 C. 巴比妥 D. 可卡因

4. 纽曼认为,二级预防中护理人员的任务主要是

- A. 减少应激原侵犯的可能性 B. 早期发现病例、早期治疗症状
C. 降低应激原的强度 D. 避免目前健康状况进一步恶化

5. 一位年轻的女性患者,住院后经治疗护理已经好转,但由于孩子突然腹泻,她毅然离开医院,承担起做母亲的责任。这种角色行为转变为患者角色

- A. 冲突 B. 强化 C. 缺如 D. 消退

6. 依据爱瑞克森的理论,青春期的发展任务是建立

- A. 信任感 B. 自主性
C. 自我认同感 D. 与他人的亲密关系

7. 属于主观资料的是
- A. 皮肤瘙痒 B. 瞳孔扩大 C. 咯血 D. 肌张力下降
8. 陈述正确的预期目标是
- A. 协助翻身,防止皮肤破溃 B. 向患者讲解吸烟的危害
C. 保持引流管通畅 D. 自诉疼痛减轻,感觉舒适
9. 一般病室适宜的温度和湿度为
- A. 16~18℃,50%~60% B. 18~20℃,50%~60%
C. 18~20℃,60%~70% D. 22~24℃,60%~70%
10. 应采取接触隔离的疾病是
- A. 流脑 B. 流行性出血热 C. 新生儿脓疱病 D. 病毒性肝炎
11. 医院感染中最重要的感染源是
- A. 已感染的患者 B. 病原携带者
C. 患者自身正常菌群 D. 医院环境
12. 患者男性,21岁。腰椎穿刺术后4小时,需采用
- A. 侧卧位 B. 中凹仰卧位 C. 半坐卧位 D. 去枕仰卧位
13. 使用约束带时应注意
- A. 定期松解,一般每4小时松开1次
B. 为安全起见,固定于床架上
C. 患者四肢必须伸直
D. 骨隆突处不可使用保护垫
14. 洪脉常见于
- A. 大出血患者 B. 休克患者
C. 主动脉瓣闭锁不全患者 D. 心包积液患者
15. 心房纤维颤动患者常能测到
- A. 间歇脉 B. 二联律 C. 三联律 D. 绀脉
16. 发作性睡眠病的特点是
- A. 常常有打鼾 B. 不能控制的突发性睡眠
C. 入睡后难以唤醒 D. 睡眠时间长
17. 阑尾炎先出现脐周及上腹痛,再转移至右下腹痛,这种疼痛的表现形式为
- A. 局部痛 B. 放射痛 C. 扩散痛 D. 牵涉痛

18. 麻醉性镇痛药适用于
- A. 重度疼痛患者
B. 中度和重度疼痛患者
C. 轻度和中度疼痛患者
D. 轻度疼痛患者
19. 胆囊造影前一日午餐应给予
- A. 高蛋白饮食
B. 高脂肪饮食
C. 高热量饮食
D. 高纤维素饮食
20. 适合给予高纤维素饮食的是
- A. 伤寒患者
B. 肾炎患者
C. 糖尿病患者
D. 痢疾患者
21. 暗红色稀果酱样便, 常见于
- A. 阿米巴痢疾
B. 急性胃肠炎
C. 霍乱
D. 细菌性痢疾
22. 呕吐物呈腐败味, 常提示患者
- A. 胆汁反流
B. 胃内出血
C. 幽门梗阻
D. 肠梗阻
23. 多尿是指 24 小时尿量多于
- A. 1000ml
B. 1500ml
C. 2000ml
D. 2500ml
24. 为尿失禁患者留置导尿是为了
- A. 进行膀胱功能训练
B. 测量尿比重, 监测肾功能
C. 保持膀胱持续空虚
D. 准确记录每小时尿量
25. 服用后需及时漱口的药物是
- A. 磺胺类药物
B. 止咳剂
C. 铁剂
D. 油剂
26. 股静脉穿刺, 正确的是
- A. 在股动脉外侧 0.5cm 处垂直刺入, 见暗红色血液, 提示进入股静脉
B. 在股动脉内侧 0.5cm 处垂直刺入, 见暗红色血液, 提示进入股静脉
C. 如一次穿刺失败, 可重复穿刺 1 次
D. 拔针后局部立即用无菌纱布加压止血 2~3 分钟
27. 某患者需输液体 2000ml, 8 小时输完(15 滴为 1ml), 应调节每分钟滴数为
- A. 40 滴左右
B. 50 滴左右
C. 60 滴左右
D. 70 滴左右
28. 某患者输血过程中, 出现皮肤瘙痒和荨麻疹, 此时应
- A. 停止输血, 皮下注射肾上腺素
B. 减慢输血速度
C. 停止输血, 将输血器与剩余血一同送检
D. 给予氧气吸入
29. 正确的标本采集方法是
- A. 检测血清酶, 需用抗凝管
B. 检测尿蛋白定量, 需留 24 小时尿标本
C. 采集痰培养标本, 应留取清晨第一口痰
D. 检查蛲虫卵, 便器应先加温

30. 局部软组织损伤初期采用冷疗的主要目的是
- A. 减轻疼痛
B. 降低体温
C. 控制炎症的扩散
D. 减轻局部出血
31. 应用止血带止血时,操作正确的是
- A. 上止血带的部位应远离伤口
B. 止血带的压力以动脉刚好不出血为标准
C. 每隔 2 小时放松 1 次
D. 止血带使用时间最多不超过 6 小时
32. 骨折固定的正确方法是
- A. 穿出伤口的骨折端,不要还纳
B. 使用夹板固定时不宜过松,以固定条带不能活动为宜
C. 固定伤肢的固定物应超越伤部上端一个关节
D. 骨隆突部位应加衬垫,但夹板和肢体之间不一定要衬软垫
33. 属于临床死亡期的表现是
- A. 意识丧失
B. 肌张力消失
C. 各种反射消失
D. 间断呼吸
34. 患者男性,65 岁,2 年前确诊心绞痛,今日午后无明显诱因出现心前区疼痛,服硝酸甘油不能缓解,急诊入院,医嘱要求查 CPK,适宜的取血时间为
- A. 明日晨起空腹
B. 睡前
C. 晚饭前
D. 即刻

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共 5 小题,每空 1 分,共 10 分)

35. 人类对环境的适应可分为生理、心理、_____及_____4 个层次。
36. 护理诊断陈述公式中 P 代表_____,E 代表_____。
37. 局部皮肤受压呈紫红色,有硬结,属于压疮的_____期;疮面如出现黄脓色渗出物,属于压疮的_____期。
38. 血液的种类包括全血、_____和_____。
39. 冷湿敷可达到降温、止血、_____和_____的目的。

三、名词解释题(本大题共 4 小题,每小题 3 分,共 12 分)

40. 内环境
41. 假性尿失禁

42. 嗜睡

43. 临时备用医嘱

四、简答题(本大题共 4 小题,每小题 6 分,共 24 分)

44. 何谓自理缺陷? 依据奥瑞姆理论可用哪几种方法来弥补自理缺陷?

45. 简述对大面积烧伤患者采取隔离的种类及主要隔离措施。

46. 感染是肠外营养常见的并发症,简述其预防措施。

47. 简述输液引起静脉炎的常见原因及治疗方法。

五、综合题(本大题共 2 小题,每小题 10 分,共 20 分)

48. 患者张某,男性,66岁,慢性咳嗽、咳痰5年,3天前因受凉咳嗽加重,夜间尤甚,咳大量黄脓痰。体检:T38.2℃,P96次/分,R22次/分,BP 130/90mmHg;两肺底闻及湿罗音。

试列出主要护理诊断并制定护理措施。

49. 患者杨某,女性,64岁,脑中风后大小便失禁。试述如何帮助患者重建排尿、排便功能。