

全国 2017 年 4 月高等教育自学考试
儿科护理学(一) 试题
课程代码:03003

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共 30 小题,每小题 1 分,共 30 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 下列不属于青春期特点的是
A. 第二性征出现,生殖器官发育成熟
B. 认知、心理社会和行为发展
C. 内分泌不稳定,面对更多社会压力
D. 体格生长缓慢进行
2. 某小儿 1 周岁,生长发育正常,其身长约为
A. 70cm B. 75cm C. 80cm D. 85cm
3. 某小儿,女,12 个月,其乳牙数目约是
A. 2~4 个 B. 4~6 个 C. 6~8 个 D. 8~10 个
4. 小儿前囟凹陷见于
A. 脱水 B. 脑肿瘤 C. 脑积水 D. 脑膜炎
5. 初乳中含有较多的
A. 铁元素 B. 矿物质 C. 饱和脂肪酸 D. 免疫因子
6. 关于预防接种注意事项的描述,错误的是
A. 严格消毒制度,预防感染 B. 严格掌握禁忌症
C. 出现局部或全身反应,不必处理 D. 做好宣传和解释工作
7. 光照疗法时,最有效的蓝色荧光灯的波长为
A. 320~370nm B. 370~420nm C. 420~470nm D. 470~520nm

8. 出生体重在同胎龄儿平均体重的第 90 个百分位以上的新生儿,称为
- A. 小于胎龄儿 B. 大于胎龄儿 C. 巨大儿 D. 适于胎龄儿
9. 新生儿可通过胎盘从母体获得的免疫物质是
- A. IgG B. IgM C. SIgA D. IgE
10. 关于早产儿消化功能的描述,错误的是
- A. 吸吮能力差 B. 吞咽反射弱
C. 贲门括约肌松弛 D. 胃酸及消化酶多
11. 新生儿发生肺透明膜病的主要原因是
- A. 低出生体重儿 B. 高危儿
C. 孕母患肺部疾病 D. 缺少肺表面活性物质(PS)
12. 新生儿脓疱病的病原体是
- A. 化脓性细菌 B. 疱疹病毒 C. 链球菌 D. 支原体
13. I 度营养不良患儿腹部皮下脂肪层厚度是
- A. 0.8 ~ 1.2cm B. 0.4 ~ 0.8cm C. 0.4cm 以下 D. 基本消失
14. 下列不属于佝偻病激期表现的是
- A. 肌张力恢复 B. 颅骨软化 C. “O”型腿 D. 骨干密度减低
15. 小儿右支气管的特点是
- A. 较长、狭窄,呈漏斗形 B. 粗而短
C. 较宽,呈水平位 D. 纤毛较多
16. 发生脓胸或脓气胸时,气管可
- A. 偏向患侧 B. 偏向健侧 C. 仍居中 D. 左右摇摆
17. 等渗性脱水血清钠的浓度为
- A. 小于 130mmol/L B. 130 ~ 140mmol/L
C. 130 ~ 150mmol/L D. 140 ~ 160mmol/L
18. 小儿最常见的酸碱平衡紊乱类型是
- A. 呼吸性酸中毒 B. 呼吸性碱中毒
C. 代谢性酸中毒 D. 代谢性碱中毒
19. 卵圆孔解剖上的闭合时间大约为出生后
- A. 3 ~ 4 个月 B. 3 ~ 5 个月 C. 5 ~ 6 个月 D. 5 ~ 7 个月

20. 目前已被公认的引起绝大多数病毒性心肌炎的病病原体是
- A. 麻疹、风疹病毒
B. 水痘、肝炎病毒
C. 腮腺炎病毒
D. 柯萨奇、埃克病毒
21. 为了观察化疗药物抑制骨髓情况,需定期复查
- A. 血象
B. 尿常规
C. 肾功能
D. 肝功能
22. 小儿出生时,中性粒细胞约占白细胞总数的
- A. 0.35 ~ 0.4
B. 0.4 ~ 0.5
C. 0.60 ~ 0.65
D. 0.65 ~ 0.70
23. 治疗小儿原发性肾病综合征的首选药物是
- A. 肾上腺皮质激素
B. 环磷酰胺
C. 双嘧达莫
D. 肝素
24. 急性肾炎患儿起病时,几乎都有
- A. 血尿
B. 高血压
C. 水肿
D. 尿少
25. 急性肾炎患儿突然出现血压升高,剧烈头痛、呕吐,惊厥等,提示可能发生了
- A. 急性心衰
B. 脑疝
C. 高血压脑病
D. 低血糖
26. 过敏性紫癜患儿如出现消化道出血,应给予
- A. 少渣饮食
B. 流食
C. 半流食
D. 禁食
27. 关于流行性腮腺炎的说法,错误的是
- A. 饭后漱口,保持口腔清洁
B. 给予流质,易消化饮食
C. 供给充足水分
D. 给予刺激性食物,促进食欲
28. 流行性脑脊髓膜炎患儿服用磺胺类药物时,为了碱化尿液,需用等量的
- A. 碳酸氢钠
B. 青霉素
C. 氯霉素
D. 甘露醇
29. 细菌性痢疾的潜伏期一般为
- A. 0.5 ~ 1 天
B. 1 ~ 2 天
C. 2 ~ 3 天
D. 3 ~ 4 天
30. 小儿心脏按压应使胸骨下陷
- A. 1 ~ 2cm
B. 2 ~ 3cm
C. 3 ~ 4cm
D. 4 ~ 5cm

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共5小题,每空1分,共10分)

31. 新生儿寒冷损伤综合征是多种因素引起的 _____ 和 _____ 硬化与水肿的一种疾病。
32. 出牙时个别小儿可出现 _____、流涎、睡眠不安、_____ 等反应。
33. 每次应用洋地黄前应测量脉搏,必要时听心率,婴儿脉率小于 _____ 次/分,年长儿脉率小于 _____ 次/分时,须与医生联系,考虑是否继续用药。
34. 小儿出生后造血可分为 _____ 造血和 _____ 造血两个阶段。
35. 腹泻脱水的患儿静脉补液的原则是 _____、先浓后淡、_____。

三、名词解释题(本大题共5小题,每小题3分,共15分)

36. 学龄期
37. 小儿单纯性肥胖
38. 甲状腺功能减低症
39. 腹泻病
40. 幼年类风湿性关节炎

四、简答题(本大题共5小题,每小题5分,共25分)

41. 影响生长发育的因素。
42. 急性呼吸衰竭患儿的治疗原则及护理措施。
43. 特发性血小板减少性紫癜的临床特点。
44. 21-三体综合征的临床表现。
45. 急性中毒患儿的护理措施。

五、论述题(本大题共2小题,每小题10分,共20分)

46. 防止维生素D缺乏性手足搐搦症患儿发生窒息的护理措施。
47. 患儿,女,3个月,生长发育迟缓。口周明显青紫,经常在哭闹后出现阵发性呼吸困难,同时伴有青紫加重,胸骨左缘第2~4肋间可闻及Ⅲ级喷射性收缩期杂音,心脏彩超显示主动脉径向右移位,右心室内径增大,流出道狭窄,右心室直接将血液注入骑跨的主动脉。X线检查示靴型心。请问:
 - (1)患儿最可能的临床诊断是什么?
 - (2)主要的护理问题有哪些?(至少答出两个)
 - (3)应采取哪些护理措施?