

全国 2015 年 10 月高等教育自学考试

外科护理学(一)试题

课程代码:03001

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共 30 小题,每小题 1 分,共 30 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 下列适用于钝性分离的组织是
A. 皮肤
B. 血管
C. 肌肉
D. 韧带
2. 麻醉前给药的常用药物不包括
A. 镇静药
B. 催眠药
C. 肌松剂
D. 抗胆碱药
3. 烧伤后低血容量性休克可发生在伤后
A. 8 小时以内
B. 12 小时以内
C. 24 小时以内
D. 48 小时以内
4. 甲状腺大部切除术后第 2 天,病人出现面部、口唇及手足部的针刺样麻木感,正确的处理是
A. 口服葡萄糖酸钙
B. 鼓励病人多进食牛奶、瘦肉
C. 按摩面部、口唇及手足部
D. 增加复方碘化钾的用量
5. 急性乳腺炎的致病菌大多为
A. 金黄色葡萄球菌
B. 溶血性链球菌
C. 肺炎球菌
D. 大肠杆菌
6. 急性腹膜炎病人早期出现恶心、呕吐的原因是
A. 胃肠道痉挛
B. 神经反射
C. 肠麻痹
D. 细菌毒素作用

7. 急性腹膜炎治疗措施中最重要的是
- A. 消除病因
B. 禁食、胃肠减压
C. 应用抗生素
D. 半卧位
8. 男性, 72 岁, 有长期便秘史, 突然出现腹痛、腹胀 2 天, 未吐, 少量粘液便 1 次, 未排气, 2 年前曾有类似发作。查体可见全腹高度膨胀, 左下腹可见巨大肠型, 有轻度压痛、反跳痛, 肠鸣音亢进。为明确诊断, 应采取的检查是
- A. 实验室检查
B. B 超
C. X 线检查
D. 腹腔穿刺
9. 给予肠梗阻病人施行胃肠减压的目的不包括
- A. 降低肠腔内压力
B. 减少体液丧失
C. 减少毒素吸收
D. 改善肠管血运
10. 肠梗阻保守治疗期间尤其应注意发现
- A. 血压改变
B. 脱水征象
C. 肠绞窄可能
D. 腹痛情况
11. 女性, 23 岁, 因急性阑尾炎行阑尾切除术后 8 小时, 目前应注意观察的并发症是
- A. 肠粘连
B. 切口感染
C. 门静脉炎
D. 内出血
12. 关于骨盆直肠间隙脓肿的叙述正确的是
- A. 肛周红肿热痛明显
B. 全身感染中毒症状明显
C. 病变发展可形成低位肛瘘
D. 是最常见的直肠肛管周围脓肿
13. 细菌性肝脓肿最主要的感染途径是
- A. 胆道
B. 肝动脉
C. 门静脉
D. 淋巴通道
14. 男性, 45 岁, 因原发性肝癌行肝叶切除, 该病人护理措施中与肝昏迷的预防无关的是
- A. 术前应用保肝药物
B. 术前使用维生素 K
C. 术后间断吸氧
D. 使用支链氨基酸
15. 某门静脉高压症病人突然发生呕血, 呕血量达 800ml。应最先进行的处理是
- A. 冰盐水胃内灌洗
B. 建立静脉通路, 快速输血
C. 三腔管压迫止血
D. 内镜下食管曲张静脉套扎
16. 在我国引起急性胰腺炎最常见的病因是
- A. 胆道疾病
B. 过量饮酒
C. 暴饮暴食
D. 高脂血症
17. 胰腺癌常见的首发症状是
- A. 黄疸
B. 呕血、黑便
C. 上腹部疼痛及饱胀不适
D. 消瘦
18. 血栓闭塞性脉管炎病人出现静息痛表明其临床分期至少是
- A. I 期
B. II 期
C. III 期
D. IV 期

19. 某病人有明显颅内压增高症状，此时慎用的检查是
- A. 腰椎穿刺
B. 头颅 X 线检查
C. 头部 CT
D. 头部 MRI
20. 小脑幕切迹疝的典型临床表现是
- A. 多无意识障碍
B. 瞳孔变化少
C. 心跳先于呼吸停止
D. 瞳孔先缩小继之散大
21. 女性，68 岁。因心脏疾病长期服用阿司匹林。近日出现头痛并渐加重，今日突然出现意识不清急诊入院。CT 示：颅骨内板与脑表面之间出现高密度半月形影，可能的医疗诊断是
- A. 硬脑膜外血肿
B. 脑震荡
C. 硬脑膜下血肿
D. 脑实质出血
22. 肋骨骨折中，较多见的骨折部位是
- A. 第 1~3 肋骨
B. 第 4~7 肋骨
C. 第 8~10 肋骨
D. 第 11~12 肋骨
23. 食管癌术后发生吻合口瘘的原因不包括
- A. 食管的解剖特点
B. 营养不良
C. 吻合口张力大
D. 每日进食次数太多
24. 尿道损伤常见的后期并发症是
- A. 会阴部血肿
B. 血尿
C. 感染
D. 尿道狭窄
25. 男性，50 岁，间歇无痛性血尿 3 个月，诊断为左侧肾癌，该病人出现血尿表明
- A. 早期肾癌
B. 晚期肾癌
C. 肿瘤内出血
D. 肾癌已侵入肾盏、肾盂粘膜
26. 儿童急性化脓性骨髓炎的好发部位是
- A. 肱骨上段
B. 髌骨
C. 胫骨下端
D. 股骨下端
27. 慢性骨髓炎急性发作时，不正确的处理方法是
- A. 抗生素治疗
B. 局部切开引流
C. 局部制动
D. 手术钻孔引流
28. 符合骨软骨瘤的临床特点的是
- A. 肿瘤生长迅速
B. X 线平片示 Codman 三角
C. 多数无症状，无意中发现骨性包块
D. 常见于手足管状骨
29. 颈椎病中最严重的类型是
- A. 脊髓型
B. 神经根型
C. 椎动脉型
D. 交感型
30. 易造成膝关节半月板损伤的活动是
- A. 下蹲
B. 身体前屈
C. 半蹲时转身
D. 长期站立

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

二、填空题 (本大题共 10 小题, 每空 1 分, 共 20 分)

31. 甲亢病人术前药物准备的目的是降低_____和减轻_____。
32. 胃大部切除术后出现倾倒综合征的根本原因为_____, 处理方法以_____为主。
33. 门静脉系统与腔静脉之间存在_____处交通支, 其中最主要的是_____交通支。
34. 胆管结石的病理改变主要取决于结石造成_____的程度及有无继发_____的发生。
35. 经皮肝穿刺胆道造影 (PTC) 检查时可能会出现胆漏、_____和_____等并发症。
36. 下肢静脉曲张好发于_____或_____的人群。
37. 食管癌发生部位以_____最多见; 其典型临床表现是_____。
38. 上肢支具的主要作用是维持上肢各关节和手的功能位、预防和纠正_____和保护_____。
39. 骨折的急救处理主要包括抢救生命、妥善处理伤口、妥善_____和迅速_____。
40. 急性血源性骨髓炎 X 线检查时会出现典型_____。对早期诊断该病有重要意义的检查是_____。

三、名词解释 (本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

41. 灭菌
42. 内生水
43. 动力性肠梗阻
44. 头皮撕脱伤
45. 急性尿潴留

四、简答题 (本大题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分)

46. 简述中心静脉压与血压变化的临床意义以及相应处理方法。
47. 简述张力性气胸病人的处理原则。
48. 简述尿三杯试验的方法及临床意义。

五、病例分析题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

49. 女性，45 岁，因腹痛、腹胀、呕吐、停止排便排气 3 天而就诊。查体：T36.8°C，P84 次/分，R20 次/分，BP 90/60mmHg，皮肤粘膜干燥，眼窝凹陷，中等程度腹胀，无固定点压痛，肠鸣音亢进，可闻及气过水声，腹膜刺激征（-），移动性浊音（-）。腹部摄片可见小肠多个气液平面。病人 1 月前曾在外院行肠粘连松解术。

问：（1）该病人可能的医疗诊断是什么？

（2）列举目前 2 个主要的护理诊断/问题。

（3）目前主要的护理措施是什么？

50. 男性，40 岁，被重物砸伤双大腿造成双股骨干骨折，急送医院就诊。病人表情痛苦，面色苍白、手足湿冷，血压 95/65mmHg，心率 105 次/分。经紧急处理后，病情基本缓解，但病人突然出现烦躁不安，呼吸困难，皮肤出现点状出血点，肢体发绀发凉。

问：（1）该病人就诊时的紧急处理的措施是什么？

（2）病人突发呼吸困难的可能原因是什么？此时的处理原则是什么？