

# 全国 2019 年 10 月高等教育自学考试

## 外科护理学(一)试题

课程代码:03001

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

### 选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

**一、单项选择题:本大题共 30 小题,每小题 1 分,共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。**

1. 等渗性脱水患者应优先静脉输注的液体是
  - A. 5%葡萄糖
  - B. 0.45%氯化钠
  - C. 血浆
  - D. 平衡盐溶液
2. 测得某患者血压 80/60 mmHg, CVP 2cmH<sub>2</sub>O, 提示患者存在
  - A. 心功能不全
  - B. 血容量相对不足
  - C. 血容量不足
  - D. 容量血管收缩
3. 手术人员穿上无菌手术衣和戴上无菌手套后,仍属于污染区的身体部位是
  - A. 胸部
  - B. 脐平以下
  - C. 肘部
  - D. 上臂
4. 男性,55 岁,发现右侧腹股沟可复性包块半年余,今晨用力排便后,包块变大变硬,明显触痛,并伴有腹痛、恶心、呕吐,目前应采取的处理是
  - A. 继续观察
  - B. 手法复位
  - C. 手术治疗
  - D. 积极止痛
5. 下列治疗措施中,通过增加钾离子向细胞内转移的途径来降低血清钾浓度的方法是
  - A. 静脉注射碳酸氢钠溶液
  - B. 透析疗法
  - C. 静脉注射葡萄糖酸钙溶液
  - D. 口服阳离子交换树脂

6. 严重烧伤后 48 小时内患者最易出现的严重并发症是  
A. 全身性感染                           B. 低血容量性休克  
C. 心功能不全                           D. 神经性休克
7. 幽门梗阻最突出的症状是  
A. 疼痛                                   B. 恶心嗳气  
C. 腹胀                                   D. 呕吐
8. 结肠癌的主要扩散途径是  
A. 淋巴转移                           B. 直接浸润  
C. 血行转移                           D. 种植转移
9. 下列关于门脉高压症行分流术后患者的护理措施正确的是  
A. 术后 48 小时内加强翻身           B. 尽早下床活动  
C. 高蛋白饮食                           D. 术后 48 小时内平卧
10. 出现夏柯 (Charcot) 三联症提示患者可能有  
A. 急性胰腺炎                           B. 急性阑尾炎  
C. 急性胆囊炎                           D. 急性胆管炎
11. 术后 24 小时内 T 管引流量一般应为  
A. 100ml 以下                           B. 100~200ml  
C. 300~500ml                           D. 500ml 以上
12. 急性胰腺炎患者禁用的药物是  
A. 呃替啶                               B. 阿托品  
C. 吗啡                                   D. 西咪替丁
13. 急性阑尾炎的特征性表现是  
A. 中上腹痛                           B. 右上腹疼痛  
C. 持续脐周疼痛                      D. 转移性右下腹痛
14. 间歇性跛行可见于  
A. 下肢深静脉血栓形成              B. 血栓闭塞性脉管炎  
C. 血栓性静脉炎                      D. 下肢静脉曲张
15. 简便而确诊率高的原发性肝癌定性诊断方法是  
A. 血液酶学检查                      B. 甲胎蛋白测定  
C. CT 检查                            D. B 超检查
16. 颅内压增高患者最常见的首发症状是  
A. 眩晕                                B. 呕吐  
C. 视物模糊                           D. 头痛

17. 患者因打架颅骨受伤，出现耳后、乳突皮下淤血，提示骨折的部位是  
A. 颅后窝 B. 颅中窝  
C. 颅前窝 D. 无法判断

18. 肋骨骨折最易发生的部位是  
A. 1-3 肋 B. 4-7 肋  
C. 8-9 肋 D. 11-12 肋

19. 肺癌 TNM 病理分期中，T 表达的含义是  
A. 原发癌肿 B. 淋巴结  
C. 远处转移 D. 浸润深度

20. 关于全肺切除患者术后护理措施描述正确的是  
A. 24 小时补液量应控制在 2000ml 以内  
B. 根据患者要求可取自由体位  
C. 保持胸腔闭式引流通畅  
D. 输液滴数保持每分钟 60 滴为宜

21. 为了解食管癌向管腔外扩展情况和有无纵隔器官或淋巴结转移，可选择的检查是  
A. 胸部 X 光片 B. 食管 X 线钡餐检查  
C. 食管脱落细胞学拉网检查 D. CT 检查

22. 食管癌术后 5-10 天，患者出现呼吸困难，胸腔积液和全身中毒症状时，可能的并发症是  
A. 肺部感染 B. 吻合口瘘  
C. 乳糜胸 D. 倾倒综合征

23. 为气管插管呼吸机辅助通气患者吸痰时，一次吸痰时间不能超过  
A. 5 秒 B. 10 秒  
C. 15 秒 D. 30 秒

24. 全程血尿提示病变一般在  
A. 前尿道 B. 输尿管  
C. 后尿道 D. 膀胱

25. 上尿路结石多数为  
A. 草酸钙结石 B. 磷酸盐结石  
C. 尿酸盐结石 D. 磷酸镁胺结石

26. 按中立位 “0°” 法测定，膝关节功能位一般是  
A. 外展位 5° B. 内旋位 5°  
C. 屈曲 5° 左右 D. 伸直位

27. 下肢骨折患者行骨牵引复位固定，一般牵引的重量是体重的  
A. 1/2 B. 1/5  
C. 1/7 D. 1/10

28. 男性，76岁，不慎被路上的薄冰滑倒，主诉髋部有压痛，下肢疼痛但还能走路，患肢外旋缩短畸形，最有可能的问题是  
A. 骨盆骨折 B. 股骨干骨折  
C. 股骨颈骨折 D. 髋骨骨折

29. 青少年最常见的恶性骨肿瘤是  
A. 巨细胞瘤 B. 骨肉瘤  
C. 骨软骨瘤 D. 内生软骨瘤

30. 颈椎病中发病率最高的类型是  
A. 神经根型 B. 脊髓型  
C. 椎动脉型 D. 交感型

非选择题部分

## 注意事项 -

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

**二、填空题：**本大题共 20 空，每空 1 分，共 20 分。

31. 乳腺癌的首发症状是患乳出现\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_的小肿块。
  32. 腹部手术后应采取体位是\_\_\_\_\_，有利于呼吸循环及腹腔引流，防止发生\_\_\_\_\_。
  33. 肠外营养最严重的代谢性并发症是\_\_\_\_\_；最严重的感染性并发症是\_\_\_\_\_。
  34. 肛裂病人的典型症状是疼痛、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。
  35. 甲亢患者术后出现甲状腺危象的发生与\_\_\_\_\_，甲亢症状未能很好控制及\_\_\_\_\_有关。
  36. 肠梗阻共同的四大症状是\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、腹胀及肛门排便排气停止。
  37. 颅脑手术后出现中枢性高热是由于损伤了丘脑下部\_\_\_\_\_所致，其特点是体温超过\_\_\_\_\_以上。
  38. 胸腔闭式引流瓶应低于胸壁引流口\_\_\_\_\_cm；随着呼吸运动，水封瓶中的水柱正常波动应在\_\_\_\_\_cm。
  39. 膀胱癌最早出现的临床表现是\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_肉眼血尿。
  40. 骨关节炎的原发病损是透明软骨的\_\_\_\_\_，主要的临床表现是\_\_\_\_\_。

**三、名词解释题：本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分。**

- 41. 肠外营养
- 42. 痉
- 43. 开放性气胸
- 44. 积累性骨折
- 45. 真性尿失禁

**四、简答题：本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。**

- 46. 简述休克患者使用血管活性药的护理要点。
- 47. 简述急性腹膜炎的腹部体征。
- 48. 简述开胸手术后放置胸腔闭式引流的目的。

**五、病例分析题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。**

- 49. 男性，70岁，因上腹不适、隐痛1个月，发现黑便1天来院就诊。行胃镜检查并行活检，结果提示胃癌，收入院治疗。在全麻下行胃大部切除术，术后留置胃管、腹腔引流管及尿管。有吸烟史35年。术后痰液较多。

请回答：

- (1) 该患者术后第一天的护理要点是什么？
- (2) 术后10天患者拔除胃管，进食约30分钟后，出现心悸、出汗、恶心等症状，请说明患者出现了什么问题并解释原因。
- 50. 男性，65岁，有“痔疮”病史10年。近期出现大便带血，为进一步诊治到医院就诊。直肠指检可触及包块，随后行纤维结肠镜检查，经病理诊断为直肠癌，癌变部位距离肛门4cm。今日在全麻下行经腹会阴联合直肠癌切除术（Miles术），左下腹行永久性结肠造口，留置骶尾部及腹腔引流管，术后安返病房。T: 36.7°C, HR: 108次/分, BP: 110/70 mmHg。左下腹伤口纱布覆盖，吸氧，静脉补液。术后尿量较少，患者主诉疼痛，口渴。

请回答：

- (1) 术后病情观察的重点是什么？
- (2) 目前患者主要的2个护理诊断/问题是什么？
- (3) 患者结肠造口开放前的护理要点是什么？