

2023 年 4 月高等教育自学考试
外科护理学(一) 试题
课程代码:03001

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。
2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 30 小题,每小题 1 分,共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 属于手术伤口感染内在因素的是
 - A. 工作人员的手臂
 - B. 外科器械
 - C. 手术区皮肤
 - D. 切口位置
2. 术后尿路感染的主要原因是
 - A. 患者抵抗力降低
 - B. 尿潴留
 - C. 留置尿管
 - D. 抗生素使用不当
3. 外科最常见的酸碱失衡类型是
 - A. 代谢性酸中毒
 - B. 呼吸性酸中毒
 - C. 代谢性碱中毒
 - D. 呼吸性碱中毒
4. 提示患者处于休克早期的临床表现是
 - A. 血压下降
 - B. 表情淡漠
 - C. 脉搏增快
 - D. 皮肤黏膜淤斑
5. 男性,56 岁,完全胃肠外营养支持 2 周,今日出现寒战、发热。首先应考虑的临床问题是
 - A. 高代谢状态
 - B. 导管性脓毒症
 - C. 肝功能受损
 - D. 高渗性脱水

6. 女性, 78 岁, 拟在全麻下行胃癌根治术, 麻醉前医嘱给予阿托品, 其主要目的是
- A. 减慢心率
B. 减轻术中疼痛
C. 减少呼吸道分泌物
D. 安定镇静
7. 男性, 6 岁, 双下肢包括臀部全部烧伤, 其面积为
- A. 30%
B. 35%
C. 40%
D. 45%
8. 某患者, 脉率 105 次/分, 脉压 45mmHg, 其甲亢程度属于
- A. 正常
B. 轻度
C. 中度
D. 重度
9. 如果乳腺癌患者皮下淋巴管被癌细胞堵塞, 引起淋巴回流障碍, 其典型临床表现是
- A. 乳房疼痛
B. 出现酒窝征
C. 乳房局部隆起
D. 出现橘皮样改变
10. 幽门梗阻最突出的临床表现是
- A. 上腹不适
B. 呕吐
C. 消瘦
D. 腹水
11. 男性, 60 岁, 2 年前因外伤有过腹部手术。近期出现呕吐, 呕吐物呈粪样, 怀疑为肠梗阻, 可能的类型是
- A. 高位肠梗阻
B. 低位肠梗阻
C. 麻痹性肠梗阻
D. 绞窄性肠梗阻
12. 女性, 40 岁, 有习惯性便秘, 最近排便后发现鲜有血, 出血不与粪便混合, 没有疼痛, 最有可能的问题是
- A. 肛裂
B. 内痔
C. 直肠癌
D. 肛瘘
13. 对不能手术切除的肝癌患者首选的治疗手段是
- A. 局部冷冻治疗
B. 免疫疗法
C. 放射疗法
D. 肝动脉栓塞化疗
14. 典型的胆管炎的临床表现包括
- A. 胆绞痛、发热、Murphy 阳性
B. 腹痛、腹水、休克
C. 腹痛、寒战高热、黄疸
D. 恶心、腹痛、便血
15. 对于胰腺炎的诊断, 描述正确的是
- A. 发病后数小时血清淀粉酶开始升高
B. 发病后尿淀粉酶最早升高
C. 诊断首选检查为腹部 CT
D. 腹部穿刺检查抽出血性渗出液

16. 符合小脑幕切迹疝的典型临床表现是
- A. 呼吸障碍明显
B. 患侧瞳孔先缩小、继之进行性散大
C. 突发意识障碍
D. 颈后压痛、颈硬
17. 男性，35岁，施工时从高处跌落导致颅前窝骨折、脑脊液鼻漏，下列护理措施正确的是
- A. 头高位卧床休息
B. 抗菌药物冲洗鼻腔
C. 无菌棉球填塞鼻腔
D. 鼓励擤涕保持鼻腔清洁
18. 硬脑膜外血肿患者的典型意识障碍表现为
- A. 清醒-昏迷
B. 持续昏迷
C. 短暂意识丧失
D. 昏迷-清醒-再昏迷
19. 开放性气胸的最主要的病理生理变化是
- A. 纵膈扑动
B. 反常呼吸
C. 静脉回流受阻
D. 纵膈移位
20. 男性，65岁，因肺癌行右肺全切术。今日为术后第一天，下列护理措施中正确的是
- A. 禁食、补液
B. 绝对卧床休息
C. 保持胸管通畅
D. 输液速度 20-30 滴/分
21. 食管癌患者的典型症状是
- A. 严重消瘦
B. 胸骨后不适
C. 呼吸困难
D. 进行性吞咽困难
22. 男性，75岁，行食管癌切除、食管胃吻合术。术后胸腔闭式引流。针对该患者胸腔闭式引流的护理措施正确的是
- A. 患者尽量采取仰卧位，以防管道脱出
B. 鼓励患者咳嗽和深呼吸
C. 保持水封瓶的长管下端在水面下 1cm
D. 引流瓶低于胸壁引流口平面 50cm
23. 男性，28岁，体育活动后出现腰部疼痛，并向下放射至下腹和大腿内侧，并出现肉眼血尿，该患者最可能的诊断是
- A. 输尿管结石
B. 膀胱癌
C. 肾癌
D. 尿道损伤
24. 男性，70岁，经尿道前列腺电切术后持续膀胱冲洗，护士观察患者肉眼血尿颜色加深，此时应该采取的措施是
- A. 停止膀胱冲洗
B. 减慢冲洗速度
C. 加快冲洗速度
D. 维持现有速度冲洗

25. 前列腺增生症患者最常见的早期临床表现是
- A. 排尿困难
B. 急性尿潴留
C. 尿频、夜尿增多
D. 血尿
26. 男性，70岁，出现无痛间歇性肉眼血尿2周。为明确诊断，应建议患者进行的检查是
- A. 膀胱镜
B. 尿脱落细胞检查
C. B超
D. 尿路造影
27. 骨筋膜室综合征最早期的症状是
- A. 肢体远端动脉搏动消失
B. 肢体剧烈疼痛
C. 患指（趾）肌力减弱
D. 局部皮肤肿胀
28. 女性，65岁，不慎摔倒致股骨颈骨折，行人工股骨头置换术。应告知患者
- A. 术后3天保持平卧
B. 术后1周内床头抬高不宜超过45度
C. 术后一月内禁止侧卧
D. 患肢保持外展中立位
29. 化脓性骨髓炎最易发生的部位是
- A. 股骨下端
B. 肱骨
C. 指骨
D. 髌骨
30. 属于潜在恶性骨肿瘤的是
- A. 骨软骨瘤
B. 成骨肉瘤
C. 巨细胞瘤
D. 软骨肉瘤

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题：本大题共20空，每空1分，共20分。

31. 浅Ⅱ度烧伤创面红润、潮湿、痛觉_____；深Ⅱ度烧伤创面白相间，痛觉_____。
32. 椎管内麻醉有两种，分别是将局部麻醉药注入_____和_____。
33. 低钾血症是指血清钾低于_____mmol/L；高钾血症是指血清钾高于_____mmol/L。
34. 胃癌的主要转移途径有直接转移、血行转移、_____和_____。
35. 我国门静脉高压症病人中90%的病人是由于_____引起。南方地区，主要是_____。

36. 血栓闭塞性脉管炎患者出现夜间或卧床时疼痛加重，这个现象称为_____。为增加侧支循环，可进行 Buerger 运动，即_____运动。
37. 成人颅内压力持续高于_____mmH₂O 即为颅内压增高，临床上出现头痛、呕吐、_____的颅内压增高的“三主征”。
38. 张力性气胸的急救原则是分秒必争，_____，降低胸膜腔内压力；通常在锁骨中线_____放置胸腔引流管行闭式引流。
39. 前尿道损伤表现为_____；后尿道损伤表现为_____。
40. 骨折的专有体征包括_____、_____、骨擦音或骨擦感。

三、名词解释题：本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分。

41. 肠外营养
42. 难复性疝
43. 腰大肌试验
44. 脑疝
45. 等张运动

四、简答题：本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

46. 简述手术后患者发生深静脉血栓的原因。
47. 简述弥漫性腹膜炎采用非手术治疗的护理要点。
48. 简述食管癌术后吻合口瘘的护理要点。

五、病例分析题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

49. 患者，男性，77 岁，消化性溃疡病史 15 年，近期加重。因突发上腹痛 1 小时急诊入院。查体：T38.2℃，P98 次/分，R22 次/分，BP140/72mmHg，神志清醒，半卧位，急性痛苦面容。腹部未见明显膨隆，无胃肠型及蠕动波；板状腹，全腹腹肌紧张，全腹压痛，反跳痛右上腹部明显；肝脾肋下未及，未触及腹内包块；肝肾区无叩击痛，腹水征阴性，肠鸣音消失。腹部立位片可见膈下游离气体。诊断为：消化道穿孔，急性弥漫性腹膜炎。

问：（1）目前最主要的治疗方法是什么？

（2）患者目前的主要护理诊断/护理问题？

（3）患者目前主要的护理措施是什么？

50. 患者，男性，45岁，生活不规律，喜食油炸食品。诊断胆石症5年，时有腹痛发作，治疗后症状可缓解。3天前右上腹痛再发，呈持续性，程度较前加重，不伴恶心、头晕、咳嗽、胸闷气促等不适。2小时前，因上腹部疼痛发作，难以忍受，急诊就医。查体：T38.4℃，P82次/分，R20次/分，BP120/73mmHg。神志清楚，全身皮肤粘膜未见黄染，无皮疹及出血点，巩膜未见黄染，浅表淋巴结未及肿大。诊断为胆囊多发结石，胆囊炎急性发作。入院后，患者全麻下行腹腔镜胆囊切除、胆总管切开取石、T管引流术。

问：（1）胆石症常见的病因。

（2）患者目前主要的护理诊断/护理问题。

（3）T管引流的护理要点。