

全国 2015 年 4 月高等教育自学考试

# 急救护理学试题

课程代码:03007

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

## 选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

### 一、单项选择题(本大题共 25 小题,每小题 1 分,共 25 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

- 下列不属于综合性重症加强治疗病房特点的是  
A. 附属于急诊科  
B. 收治对象不分专科  
C. 由医院直接领导  
D. 以处理多脏器功能损害为主要工作内容
- 救护被毒蛇咬伤下肢的伤员时,应为其采取的体位是  
A. 抬高患肢  
B. 平卧位  
C. 放低患肢  
D. 中凹位
- 根据病情分类方法进行急诊分诊时,属于 II 类患者的是  
A. 处于危及生命状态,生命体征不稳定者  
B. 处于潜在危及生命状态,生命体征处于临界状态,但有快速恶化的潜在危险者  
C. 处于有潜在恶化的危险状态,生命体征相对稳定者  
D. 处于急性但稳定的状态,生命体征稳定者
- 脓毒血症患者典型的热型是  
A. 间歇热  
B. 稽留热  
C. 弛张热  
D. 回归热
- 患者,男性,28 岁,因受凉后出现咳嗽、咳痰、伴发热 2 天就诊。2 天来,患者的体温始终在 39~39.5℃ 之间,痰液颜色呈铁锈色。根据患者病史和热型的特点,分诊护士应考虑其发生了  
A. 大叶性肺炎  
B. 肺结核  
C. 支气管扩张  
D. 感染性心内膜炎
- 因实质性脏器的包膜受到外在牵引所致的腹痛属于  
A. 内脏性腹痛  
B. 躯体性腹痛  
C. 感应性腹痛  
D. 放射性腹痛

7. 在 ICU 中为防止空气传播感染,有效的措施是
- A. 严格手卫生  
B. 负压病房  
C. 穿隔离衣  
D. 无菌操作
8. 反映患者外周循环状况的指标是
- A. 心率  
B. 收缩压  
C. 脉压  
D. 皮肤颜色和温度
9. 护士使用 Braden 压疮评估表为某位患者进行皮肤评估,得分为 11 分,提示该患者压疮发生的危险程度为
- A. 无危险  
B. 轻度危险  
C. 中度危险  
D. 高度危险
10. 患者发生心脏骤停后,能够最大限度提高其生存率的除颤时间是
- A. 2~4 分钟  
B. 5~8 分钟  
C. 8~10 分钟  
D. 10~12 分钟
11. 下列临床问题中不宜给予患者碳酸氢钠治疗的是
- A. 高血钾  
B. 高碳酸血症性酸中毒  
C. 糖尿病酮症酸中毒  
D. 阿司匹林过量
12. 采用救护车转运伤员时,不正确的措施是
- A. 将伤员身体固定于平车上,避免剧烈震荡造成再损伤  
B. 转运途中加强对重伤员并发症的监测和预防  
C. 上下坡时保持伤员头低位,保证脑血流灌注  
D. 确保留置管道的固定,防止脱落
13. 一侧股骨开放性骨折患者的出血量一般大于
- A. 1500ml  
B. 2000ml  
C. 2500ml  
D. 3000ml
14. 不同类型的脱水的共同特点是
- A. 口渴  
B. 尿比重高  
C. 尿少  
D. 手足麻木
15. 患者,男性,30 岁,食用不洁食物后呕吐、腹泻 1 天,患者乏力、口唇干燥、脉搏增快,尿少,血清钠 137mmol/L。患者体重 70kg,估计其体液丧失量为
- A. 2000ml  
B. 2500ml  
C. 3000ml  
D. 3500ml
16. 使用碱性药物纠正酸中毒,一般先将 pH 值纠正至
- A. 7.20~7.25  
B. 7.25~7.30  
C. 7.30~7.35  
D. 7.35~7.40
17. 颅内压增高时出现的 Cushing 三联征指
- A. 体温高、脉搏快、血压高  
B. 脉搏慢、呼吸慢、血压高  
C. 脉搏慢、呼吸快、体温高  
D. 脉搏快、呼吸慢、血压低

18. 热痉挛的主要发病机制是
- A. 体温调节中枢障碍  
B. 汗腺功能衰竭  
C. 钠、钾丢失过多  
D. 机体产热过多
19. 成人轻度烧伤是指
- A. 总面积在 20%以下的 I 度烧伤  
B. 总面积在 9%以下的 II 度烧伤  
C. 总面积在 9%以下的 III 度烧伤  
D. 总面积在 10%~29%的烧伤
20. 用生理盐水洗胃时, 洗胃液的温度应控制在
- A. 32~34℃  
B. 35~37℃  
C. 38~41℃  
D. 42~45℃
21. 下列关于毒物代谢的描述, 正确的是
- A. 主要经肾脏代谢  
B. 部分重金属可经消化道代谢  
C. 性别与代谢无关  
D. 毒物经代谢后毒性可能增强
22. ST 段抬高的急性心肌梗死发生后, 最初的心电图改变是
- A. Q 波形成  
B. R 波低电压  
C. ST 段压低  
D. T 波高尖
23. 上消化道出血定位及定性诊断首选的方法是
- A. 纤维内窥镜  
B. B 型超声  
C. CT  
D. MRI
24. 引起脓毒症的主要因素是
- A. 内皮素  
B. 内毒素  
C. 肠毒素  
D. 细菌 DNA
25. 下列关于除颤能量的选择, 正确的是
- A. 双相截顶指数波除颤仪选择 120J  
B. 直线双相波除颤仪选择 150J  
C. 单相波除颤仪选择 360J  
D. 不确认为何种双相波除颤仪时选默认能量 120J

## 非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

### 二、填空题(本大题共 15 小题, 每空 1 分, 共 15 分)

26. 急诊医疗服务体系的第一个环节是\_\_\_\_\_。
27. 根据现代医学急救的观点, 猝死患者抢救的最佳时间是\_\_\_\_\_分钟。
28. 急诊科的设置与布局要以方便患者就诊治疗, 符合\_\_\_\_\_为原则, 同时又要有利于预防和控制医院感染。
29. 感染性疾病包括常见的各种病原体引起的\_\_\_\_\_、全身性或局灶性感染。
30. ICU 每张病床的使用面积不少于\_\_\_\_\_平方米。

31. 心脏骤停的直接原因是致命性心律失常，最为常见的形式是\_\_\_\_\_或无脉性室性心动过速。
32. 按灾难现场检伤分类标准，伤员虽有重大创伤，但可短暂等候而不导致肢体残缺者应属于第\_\_\_\_\_优先。
33. 休克患者的液体补充应以\_\_\_\_\_压和动脉压为指导。
34. 高钙血症主要由\_\_\_\_\_和恶性肿瘤所引起。
35. 腹部空腔脏器损伤患者主要表现为弥漫性或局限性的\_\_\_\_\_。
36. 高温环境中，人体散热方式主要是\_\_\_\_\_。
37. 急性一氧化碳中毒患者氧疗的作用是纠正缺氧和促使\_\_\_\_\_离解。
38. 对急性呼吸衰竭患者进行氧疗时，吸入纯氧一般不超过\_\_\_\_\_小时。
39. 多器官功能障碍综合征是指机体遭受急性损伤\_\_\_\_\_小时后出现的多系统或器官功能障碍。
40. 经鼻气管插管的导管型号通常比经口插管小\_\_\_\_\_mm。

### 三、名词解释（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

41. 院前急救
42. 间歇热
43. 代谢性酸中毒
44. 心力衰竭
45. 脓毒症

### 四、简答题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

46. 简述保持呼吸困难患者呼吸道通畅的急救与护理措施。
47. 简述心脏骤停的临床表现。
48. 简述休克时肺脏的继发性损害。
49. 简述洗胃的禁忌证。

### 五、论述题（本大题共 1 小题，10 分）

50. 试述冻伤分区及各区病情特点。

### 六、案例分析题（本大题共 1 小题，15 分）

51. 患者，男性，30 岁，交通事故后出现一过性神志不清，清醒后感左上腹持续性疼痛。  
查体：T 37.4°C，P 120 次/分，BP 80/50mmHg，面色苍白，出冷汗，肢端发凉，腹部明显压痛、反跳痛和移动性浊音。腹腔穿刺抽出不凝固血液。

请写出：

- (1) 该患者可能的诊断及依据；
- (2) 目前对该患者非手术治疗的主要内容。