

# 全国 2016 年 4 月高等教育自学考试

## 急救护理学试题

课程代码:03007

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

### 选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

#### 一、单项选择题(本大题共 25 小题,每小题 1 分,共 25 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 世界上最早的监护病房出现在二十世纪  
A. 50 年代  
B. 60 年代  
C. 70 年代  
D. 90 年代
2. “时间就是生命”体现的是院前急救特点中的  
A. 社会性  
B. 突发性  
C. 紧迫性  
D. 风险性
3. 根据病情分类方法进行急诊分诊时,属于 IV 类患者的是  
A. 处于危及生命状态,生命体征不稳定者  
B. 处于潜在危及生命状态,生命体征处于临界状态者  
C. 处于有潜在恶化的危险状态,生命体征相对稳定者  
D. 处于急性但稳定的状态,生命体征稳定者
4. 患者,男性,28 岁,因咳嗽咳痰伴发热 2 天就诊。2 天来,患者的体温始终在 39~39.5℃ 之间,判断其热型为  
A. 不规则热  
B. 稽留热  
C. 回归热  
D. 消耗热



15. 心源性休克最为多见的病因是
- A. 严重心肌炎  
B. 心肌病  
C. 慢性心力衰竭  
D. 急性心肌梗死
16. 水中毒对机体最严重的影响是
- A. 脑细胞水肿  
B. 肾功能受损  
C. 心脏负担加重  
D. 循环障碍
17. 经静脉使用钙剂时，下列药物中不能同时使用的是
- A. 维生素 C  
B. 氯化钠  
C. 氯化钾  
D. 碳酸氢钠
18. 使用格拉斯哥评分法评估患者的意识状态，昏迷患者的评分在
- A. 6 分以下  
B. 8 分以下  
C. 10 分以下  
D. 12 分以下
19. 下列关于进行性血胸的描述，不正确的是
- A. 抗休克治疗后病情继续恶化  
B. 血色素进行性下降  
C. 胸腔穿刺出不凝固血液  
D. 胸腔闭式引流超过 200 毫升/小时
20. 患者，男性，24 岁，冬季野外值勤后出现双足趾皮肤紫红、肿胀，部分足趾上有淡黄色小水泡，刺痛难忍。据此，可判断其冻伤的分度为
- A. I 度  
B. II 度  
C. III 度  
D. IV 度
21. 冻伤患者局部复温治疗中，提示受伤肢体血管收缩终止的信号是
- A. 局部起水泡  
B. 局部皮肤脱落  
C. 局部皮肤青紫、僵硬  
D. 肢体变红并柔软
22. 下列药物中，属于胆碱酯酶复能剂的是
- A. 解磷定  
B. 氟马西尼  
C. 解氟灵  
D. 纳络酮
23. 阿片类药物中毒的典型症状表现为
- A. 昏迷、瞳孔缩小、呼吸窘迫  
B. 谵妄、瞳孔放大、呼吸抑制  
C. 昏迷、瞳孔缩小、呼吸抑制  
D. 谵妄、瞳孔放大、呼吸窘迫
24. 下列体征符合全身性炎症反应综合征的是
- A. 体温 36.8℃，呼吸 22 次/分  
B. 心率 96 次/分，呼吸 18 次/分  
C. 体温 39.6℃，外周血白细胞计数  $13 \times 10^9/L$   
D. 心率 118 次/分，外周血白细胞计数  $6 \times 10^9/L$
25. 气管切开后常见并发症不包括
- A. 皮下气肿  
B. 血栓栓塞  
C. 出血  
D. 气管-食管瘘

# 非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

## 二、填空题（本大题共 15 小题，每空 1 分，共 15 分）

26. 急救中心接到呼救电话至急救车到达现场所需的时间称为\_\_\_\_\_。
27. 除分类外，分诊的另一个重要目标是\_\_\_\_\_。
28. 体温高低不等，昼夜之间体温波动范围较大，常超过 1℃，但最低温度仍在正常体温以上的发热类型是\_\_\_\_\_。
29. 患者两侧肢体血压相差超过\_\_\_\_\_mmHg 时，应固定同一肢体测量血压。
30. 非专业人员可根据突发\_\_\_\_\_、呼吸停止、面色苍白或发绀等临床征象判断心跳骤停。
31. 心脏骤停时，\_\_\_\_\_系统的症状出现得最早、最显著。
32. 简单检伤分类及快速治疗（START）程序评估内容包括行动检查、\_\_\_\_\_检查、血液循环检查及清醒程度检查。
33. 休克早期由于血液\_\_\_\_\_和脑循环的自身调节，保证了脑的血液供应。
34. 外科患者最易出现的脱水类型是\_\_\_\_\_。
35. 四肢骨折的典型临床表现是\_\_\_\_\_、反常活动和骨擦音或骨擦感。
36. 淹溺者首要的急救措施是立即进行\_\_\_\_\_。
37. 毒物吸收的三大主要途径包括消化道、呼吸道和\_\_\_\_\_。
38. 理想状态下，经皮冠状动脉介入治疗（PCI）应在患者入院的\_\_\_\_\_分钟内进行。
39. 多器官功能障碍综合征是指机体遭受急性损伤\_\_\_\_\_小时后出现的多系统或器官功能障碍。
40. 测量口咽通气道的置管长度时，应测量患者\_\_\_\_\_到口角的距离。

## 三、名词解释（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

41. 脑复苏
42. 生存链
43. 休克
44. 低渗性脱水
45. 挤压综合征

## 四、简答题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

46. 简述胸痛患者病情评估时快速目测应观察的内容。
47. 简述灾时医院感染预防与控制基本原则。
48. 简述强碱烧伤的特点。
49. 简述简易人工呼吸皮囊单人 E-C 法通气的操作要点。

## 五、论述题（本大题共 1 小题，10 分）

50. 举例说明急性中毒的机制。

## 六、案例分析题（本大题共 1 小题，15 分）

51. 患者，男性，34 岁，因“反复上腹隐痛 10 年，呕血、黑便 1 天”就急诊。患者近 10 年来反复上腹部隐痛，进食后可缓解，未就诊。近来工作繁忙经常熬夜，今晨突感上腹部不适并呕血 400ml，解柏油样大便 4 次，量约 700 克，晕倒在地，立即被送来医院。体格检查：T 37.5℃，P 128 次/分，R 24 次/分，BP 85/50mmHg，神清合作，面色苍白，皮肤巩膜无黄染，未见肝掌、蜘蛛痣，双肺呼吸音清晰，心界不大，HR 128 次/分，律齐，未闻及杂音，腹软，剑突下压痛，无反跳痛，肝、脾未扪及，肠鸣音 18 次/分，移动性浊音阴性，四肢冷，膝腱反射正常。实验室检查：血常规 Hb 65g/L，WBC  $9.0 \times 10^9/L$ 。请写出：

- (1) 该患者出血最可能的病因；
- (2) 该患者出血定位、定性诊断的首选方法；
- (3) 应立即采取的急救与护理措施。