

2022 年 10 月高等教育自学考试

急救护理学试题

课程代码:03007

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。
2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 30 小题,每小题 1 分,共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 急救护理始于
 - A. 文艺复兴时期
 - B. 20 世纪 60 年代
 - C. 南丁格尔时代
 - D. 20 世纪 80 年代
2. 当患者呼之不应时,分诊护士首先要检查患者的
 - A. 呼吸情况
 - B. 瞳孔情况
 - C. 血压情况
 - D. 血氧饱和度
3. 铁锈色痰多见于
 - A. 大叶性肺炎
 - B. 克雷伯菌肺炎
 - C. 病毒性肺炎
 - D. 急性左心衰
4. 胸外按压过程中,因下列操作而中断按压的时间符合美国心脏协会要求的是
 - A. 换人 4 秒
 - B. 除颤 15 秒
 - C. 2 次吹气 18 秒
 - D. 插管 25 秒
5. 为保证胸外按压质量,胸外按压分数(CCF)至少应大于
 - A. 20%
 - B. 40%
 - C. 60%
 - D. 80%
6. 下列血气指标中用于反映氧合状态的指标是
 - A. SB
 - B. PaO₂
 - C. pH
 - D. BE

7. 低渗性缺水患者血清钠水平在 130~135mmol/L, 其缺钠程度为
- A. 轻度
B. 中度
C. 重度
D. 极重度
8. 抗休克最基本的措施是
- A. 安置体位
B. 气道管理
C. 处理并发症
D. 补充血容量
9. 胸外心脏非同步直流电除颤时, APEX 手柄电极应放置的位置是
- A. 右腋中线第 5 肋间
B. 左腋中线第 5 肋间
C. 右锁骨中线第 2 肋间
D. 左锁骨中线第 2 肋间
10. 某哮喘患者急性发作时, 不能讲话, 并出现胸腹反常运动, 判断该患者病情严重程度分级为
- A. 轻度
B. 中度
C. 重度
D. 危重
11. 急性心肌梗死患者行溶栓治疗后, 提示血管再通的征象不包括
- A. 2 小时内胸痛基本消失
B. 2 小时内出现再灌注心律失常
C. 2 小时内抬高的 ST 段回落 > 50%
D. 2 小时内血清淀粉酶峰值提前出现
12. 下列心律失常的发生属于冲动传导异常的是
- A. 心房颤动
B. 期前收缩
C. 窦性心动过缓
D. 预激综合征
13. 高血压脑病患者开始降压的 1 小时内, 平均动脉压的降低幅度不超过治疗前水平的
- A. 45%
B. 35%
C. 25%
D. 15%
14. 大便不变黑, 但大便隐血试验阳性提示患者的出血量为
- A. <50ml
B. 50~100ml
C. 200~500ml
D. >500ml
15. 尿石症患者预防结石复发的措施不包括
- A. 大量饮水
B. 调节饮食
C. 定期导尿
D. 合理用药
16. 精索扭转多发生在
- A. 肾结石患者
B. 老年人
C. 糖尿病患者
D. 青少年
17. 解除急性尿潴留最直接有效的方法是
- A. 手术切开尿道口狭窄部位
B. 协助患者调整排尿体位和姿势
C. 实施导尿术
D. 行耻骨上膀胱造瘘

18. 输注胰岛素过程中最常见的并发症是
- A. 低血糖
B. 局部脂肪增生
C. 静脉炎
D. 皮肤过敏
19. 抢救糖尿病酮症酸中毒的关键措施是
- A. 补液
B. 补钾
C. 补充胰岛素
D. 抗感染
20. 甲状腺危象的病因不包括
- A. 感染
B. 使用抗甲状腺药物
C. 应激
D. 接受甲状腺手术
21. 癫痫发作时的护理措施中不正确的是
- A. 边抢救边呼叫，切勿离开患者
B. 头转向一侧，保持呼吸道通畅
C. 将缠有纱布的压舌板置于上下门齿之间，以免舌咬伤
D. 抽搐时勿用力按压抽搐肢体，以免骨折
22. 按照新九分法，双上肢烧伤的患者烧伤面积为
- A. 9%
B. 18%
C. 27%
D. 36%
23. 临床上最常见的宫外孕类型是
- A. 卵巢妊娠
B. 输卵管妊娠
C. 腹腔妊娠
D. 阔韧带妊娠
24. 下列关于机械性眼外伤患者的护理措施中，不妥的是
- A. 眼睑水肿者早期局部冷敷
B. 用无菌纱布遮盖伤眼
C. 取异物术后遵医嘱使用抗生素
D. 取异物术前冲洗结膜囊
25. 对鼻出血患者实施指压止血法时，患者应采取的体位为
- A. 平卧位
B. 俯卧位
C. 坐位
D. 头低脚高位
26. 下列临床表现提示为小儿急性喉炎的是
- A. 咯血
B. 心悸
C. 铁锈色痰
D. 犬吠样咳嗽
27. 下列因素中，易致中暑的是
- A. 甲状腺功能减退
B. 环境湿度过高
C. 久坐
D. 消瘦

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

三、简答题：本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

36. 简述 AED 除颤的操作步骤。
37. 简述低钾血症的补钾原则。
38. 简述为外伤患者实施包扎的注意事项。
39. 简述低血糖危象患者升血糖治疗的急救护理措施。

四、论述题：本大题共 1 小题，10 分。

40. 论述颅脑损伤患者病情评估的要点。

五、病例分析题：本大题共 2 小题，每小题 15 分，共 30 分。

41. 患者，男性，46 岁，因饱餐后出现剧烈上腹痛、阵发性加重半小时来诊。患者神志清楚，痛苦面容，肥胖体态，疼痛位于右腹部，呈绞痛，程度剧烈且阵发性加重，无放射，无明显转移痛，蹲位疼痛有所减轻，伴恶心、呕吐、大汗，呕吐 2 次，均为胃内容物，腹部平坦，右上腹压痛及反跳痛 (+)，Murphy 征 (+)。既往有胆囊炎、胆石症病史 2 年。

请按照腹痛的“PQRST”分诊法对该患者的疼痛情况进行分析，并逐一说明。

42. 患者，男性，64 岁，主因“持续胸痛 1 小时”就诊。患者晨起突感胸骨后剧烈疼痛，伴有大汗、恶心，自服硝酸甘油 30 分钟后疼痛仍不缓解。近 1 月无明显诱因多次出现心前区憋闷，每次持续约 20~30 分钟，休息不能完全缓解。查体：神清，痛苦面容，T 37.4℃，P 96 次/分，R 18 次/分，BP 120/80mmHg。心电图示：V₁-V₅ 导联 ST 段弓背向上抬高。患者既往高血压病史 10 余年，目前无活动性出血。初步诊断为急性冠脉综合征，拟行急诊经皮冠状动脉介入治疗。

请写出：

- (1) 该患者初步诊断为急性冠脉综合征的依据；
- (2) 为进一步明确诊断，该患者必做的一项实验室检查；
- (3) 针对该患者目前状况的主要急救护理措施。