

全国 2015 年 10 月高等教育自学考试
护理学研究试题
课程代码:03008

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题 (本大题共 20 小题,每小题 1 分,共 20 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 关于“压疮问题的探讨”这一研究问题的确定,不合适之处是
 - 选题范围过大
 - 没有结合临床实践
 - 对临床指导意义不大
 - 研究问题不可行
2. 已知有关优质护理方面的研究是从 2010 年开始的,因此如果要查找优质护理方面的相关文献,就可以从 2010 年以后逐年向近期查找。这种文献检索的方法是
 - 追溯法
 - 顺查法
 - 倒查法
 - 抽查法
3. 某研究者欲调查各类不同的健康宣教方法对患者健康教育效果的影响。在此研究中,自变量是
 - 健康宣教方法
 - 健康教育效果
 - 患者文化程度
 - 护士的年资
4. 某社区卫生服务中心欲了解该社区内居住的 60 岁以上老人的认知功能随年龄增长而发生变化的趋势,拟每年为每一位老人进行 1 次认知功能评定,连续进行 5 年。此研究设计类型是
 - 回顾性研究
 - 前瞻性研究
 - 干预性研究
 - 质性研究
5. 某护士进行有关“音乐疗法对患者术前焦虑水平的影响”的研究。在研究中,她对患者播放某种为该研究所设计的音乐。这种做法是实验性研究中的
 - 设立对照
 - 随机化
 - 盲法
 - 干预

6. 某护士在进行问卷调查的过程中，发现问卷应答率仅为 60%。此时收集上来的数据可能会产生的偏倚是
A. 选择性偏倚 B. 信息性偏倚
C. 报告偏倚 D. 测量偏倚
7. 某护士欲研究某医院护士的职业态度，该医院内护士中研究生学历的护士占 5%，本科学历的护士占 20%，大专学历的护士占 40%，中专学历的护士占 35%。她欲从中抽取一个 100 人的样本，对研究生、本科、大专、中专学历的护士分别随机抽取 5 人，20 人，40 人，35 人，合起来组成所需的样本。她使用的抽样方法是
A. 系统抽样 B. 单纯随机抽样
C. 整群抽样 D. 分层抽样
8. 检验因果假设最有说服力的一种研究设计是
A. 实验性研究 B. 类实验性研究
C. 质性研究 D. 相关性研究
9. 问卷调查法最大的优点是
A. 省钱、省时 B. 回收率高
C. 提供材料真实 D. 可获得更深入的资料
10. 档案记录法的缺点是
A. 应答偏差大 B. 花费大
C. 涉及伦理问题 D. 影响因素较多
11. 反映研究工具内在一致性的是
A. 重测信度 B. 复本信度
C. 折半信度 D. 评定者间信度
12. 能够反映研究工具与现有标准之间相关性的是
A. 同时效度 B. 预测效度
C. 结构效度 D. 表面效度
13. 论著的篇幅一般为
A. 1000-3000 字 B. 3000-5000 字
C. 4000-6000 字 D. 5000-8000 字
14. 下列关于结构效度的陈述正确的是
A. 多由专家委员会进行评议 B. 重点是了解工具的内在属性
C. 根据评估人对概念的理解 D. 反映研究工具与其他测量标准的相关性
15. 某计量资料属偏态分布，欲进行单样本与总体的比较，应采用的统计学方法是
A. 单样本 t 检验 B. 配对 t 检验
C. 单样本秩和检验 D. 单因素方差分析
16. 某研究收集了 100 例研究对象的血压值 (mmHg)，按正常/异常分为两类，此资料为
A. 计量资料 B. 半定量资料
C. 计数资料 D. 有序分类资料
17. 对某计数资料欲进行两个样本率的比较，应采用的统计学方法是
A. 关联性分析 B. 四表格 χ^2 检验
C. Pearson 相关分析 D. 配对 t 检验

18. 不属于质性资料分析的过程是
A. 理解 B. 综合
C. 理论化 D. 设立假设检验

19. 一篇文章选用的关键词数量一般为
A. 2-4 个 B. 3-5 个
C. 4-6 个 D. 5-7 个

20. 题目为“老龄原发性高血压患者的社区干预护理体会”的文章
A. 研究论文 B. 个案论文
C. 经验论文 D. 综述论文

二、多项选择题（本大题共 13 小题，每小题 2 分，共 26 分）

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂墨。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

21. 科学研究遵循的基本原则是
A. 可重复性原则 B. 创新性原则
C. 个别现象原则 D. 客观性原则
E. 实验原则

22. 构成研究中知情同意的要素包括
A. 信息的告知 B. 信息的解释
C. 同意的能力 D. 自主性同意
E. 补偿的方法

23. 下列变量中属于分类变量的是
A. 性别（男、女） B. 身高（cm）
C. 脉搏（次/分） D. 疗效（治愈、显效、好转、无效）
E. 文化程度（小学、初中、高中、本科及以上）

24. 关于 KR-20 值下列陈述正确的是
A. 反映研究工具的稳定性 B. 反映研究工具的内在一致性
C. 反映研究工具的等同性 D. 是 Cronbach's α 的一种特殊形式
E. 适用于二分制的研究工具

25. 下列属于非概率抽样的方法是
A. 定额抽样 B. 目的抽样
C. 系统抽样 D. 整群抽样
E. 滚雪球抽样

26. 减少抽样误差的方法有
A. 增加样本量 B. 选择变异程度小的研究指标
C. 选择计数资料 D. 尽可能采取方便抽样的方法
E. 选择偏态分布资料

27. 某计量资料属正态分布，欲比较组间差异，下列陈述正确的是
A. 采用配对 t 检验进行配对资料的比较
B. 采用 Wilcoxon 符号秩和检验进行配对资料的比较
C. 采用 Mann-Whitney U 检验进行两个独立样本的比较
D. 采用独立样本 t 检验进行两个独立样本的比较
E. 采用单因素方差分析进行多个独立样本的比较
28. 关于秩和检验，下列陈述正确的是
A. 属于参数统计方法 B. 属于非参数统计方法
C. 可用于等级资料的比较 D. 可用于计数资料组间差异比较
E. 可用于呈偏态分布的计量资料的比较
29. 问卷调查法收集资料的形式包括
A. 邮寄问卷 B. 现场发放和收回
C. 电话访谈完成 D. 半结构式访谈完成
E. 非结构式访谈完成
30. 观察法按观察情形分类可分为
A. 自然观察法 B. 结构式观察法
C. 非结构式观察法 D. 标准情形观察法
E. 半结构式观察法
31. 护理研究论文的正文包括
A. 前言 B. 材料与方法
C. 结果 D. 讨论
E. 结论
32. 护理研究论文的文题要求
A. 新颖 B. 切题
C. 简明 D. 规范
E. 科学
33. 护理综述论文的写作步骤包括
A. 选题 B. 收集资料
C. 整理资料 D. 分析资料
E. 撰写

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

三、名词解释（本大题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分）

34. 信息
35. 研究设计

36. 变量

37. 研究目的

38. 非结构式访谈

39. 个案研究

四、简答题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

40. 简述混杂性偏倚的控制方法。

41. 简述评定者间信度和复本信度的共同点和区别点。

42. 简述自设问卷的用词要求。

43. 简述设计收集资料的方案前应考虑的问题。

五、应用题（本大题共 1 小题，10 分）

44. 某研究者在查阅大量文献的基础上，自行设计了“哮喘患者疾病自我管理能力”量表，将对其量表进行内容效度的检测。请列出研究者具体的工作方案。