

# 全国 2018 年 10 月高等教育自学考试

## 护理学研究试题

课程代码:03008

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

### 选择题部分

#### 注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 20 小题,每小题 1 分,共 20 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 世界上第一份护理研究报告是关于

- A. 控制医院内感染
- B. 分析护理教育的缺陷
- C. 改进护理工作的程序
- D. 对护理人员合理安排

2. 在获取研究对象的知情同意时,如需他人代行其知情同意权,正常的代行顺序为

- A. 子女—配偶—父母
- B. 配偶—子女—父母
- C. 父母—子女—配偶
- D. 配偶—父母—子女

3. 某研究者根据其所获取到的一篇文章后面所列出的参考文献,逐一进行追查检索,得到原文,然后再从这些原文后所列的参考文献目录逐一扩大文献信息范围。这种文献检索方法是

- A. 追溯法
- B. 顺查法
- C. 倒查法
- D. 抽查法

4. 在“体重与血压关系的探讨”这一研究中,“体重”是

- A. 自变量
- B. 外变量
- C. 依变量
- D. 干扰变量

5. 某研究者在选择观察机体缺氧程度的指标时,选择的是血氧饱和度而不是呼吸和面色,这是因为研究者特别考虑到了指标的

- A. 准确性
- B. 客观性
- C. 灵敏性
- D. 可行性

6. 在使用四格表专用公式进行  $\chi^2$  检验时, 要求四格表中每个格子的理论数  $T$  要大于或等于
- A. 3  
B. 4  
C. 5  
D. 6
7. 某研究者在 MEDLINE 数据库中对文献发表年代进行界定后再检索, 那么他应该寻找的代表“出版年”的字段是
- A. AU  
B. TI  
C. PT  
D. PY
8. 在不知道研究对象分组情况的前提下进行研究过程中指标的观测、数据的收集和结论的判断, 这种方法是
- A. 随机化  
B. 盲法  
C. 预试验  
D. 设立对照
9. 类实验研究设计中一定要有
- A. 对照组  
B. 随机分组  
C. 干预措施  
D. 随机取样
10. 对特定人群进行定期随访, 观察疾病或某种特征在该人群及个体中的动态变化是
- A. 普查  
B. 抽样调查  
C. 现况调查  
D. 纵向研究
11. 通过使用脸谱、阶梯等形象图形, 用于测评人们对某种经历的感受, 例如疼痛、乏力、恶心、呼吸困难等的测评量表是
- A. 评定量表  
B. Likert 量表  
C. 语义差异量表  
D. 视觉类似物量表
12. 某英国医师从 1951 年开始对居住在英国的注册医师就吸烟与医师发生肺癌的关系进行长达 20 年的研究, 此研究属于
- A. 回顾性研究  
B. 病例对照研究  
C. 队列研究  
D. 现况调查
13. 先把个体聚集成群, 然后随机抽取其中的几个群, 被抽到的群中所有个体组成样本, 这种抽样方法是
- A. 单纯随机抽样  
B. 系统抽样  
C. 分层抽样  
D. 整群抽样
14. 某研究者欲研究哮喘患者的自我照顾行为, 如她选择病房的住院患者作为研究对象, 对患者住院前的居家自我照顾行为进行调查, 那么就会出现
- A. 分组偏倚  
B. 无应答偏倚  
C. 诊断性偏倚  
D. 入院率偏倚

15. 某研究者在研究正式进行前,先对其要使用的人格问卷进行预试验,对10人在使用人格问卷询问后间隔1周再进行第2次测试,获得的2次测试分值的相关系数是0.85,此时研究者测评工具的信度是
- A. 重测信度  
B. 折半信度  
C. 内在一致性信度  
D. 复本信度
16. 下列属于计数资料的是
- A. 病程(年)  
B. 身高(cm)  
C. 治疗效果(治愈、显效、好转、无效)  
D. 性别(男/女)
17. 对于二分制的研究工具,即回答“是”或“否”,“正确”或“错误”的研究工具,在计算其信度时,最适用的信度类型是
- A. 折半信度  
B. Cronbach'α 相关系数  
C. KR-20 值  
D. 复本信度
18. 反映正态分布计量资料的平均水平的指标是
- A. 标准差  
B. 中位数  
C. 四分位数间距  
D. 均数
19. 下列有关护理经验论文的描述,正确的是
- A. 只可以写成功的经验,不能写失败的教训  
B. 只可以写某种疾病的护理方法,不能写护理教学实践的体会  
C. 在文中要加强和充实护理内容  
D. 撰写形式单一,受固定格式约束
20. 在撰写论文题目时,英文题目中的实词一般不超过
- A. 10 个  
B. 15 个  
C. 20 个  
D. 25 个

二、多项选择题:本大题共13小题,每小题2分,共26分。在每小题列出的备选项中至少有两项是符合题目要求的,请将其选出,错选、多选或少选均无分。

21. 在“静脉进针穿刺角度的探讨”这一研究中,研究者欲观察不同的进针角度与疼痛感之间的关系。此研究中外变量包括
- A. 进针角度  
B. 穿刺部位  
C. 疼痛感  
D. 操作者的熟练程度  
E. 研究对象对疼痛的耐受性
22. 下列有关研究假设的描述,正确的是
- A. 假设是预期性的研究结果  
B. 假设是对变量之间关系的暂时性答案  
C. 假设无需研究最后进行肯定或否定  
D. 假设可以帮助研究者明确研究目的  
E. 假设是根据相关的理论和知识进行归纳推理后产生的
23. 下列有助于提高文献阅读效率的策略是
- A. 先读专题文献,后读综合性文献  
B. 先粗读,后精读  
C. 先读文摘后读原文  
D. 先读中文文献,后读外文文献  
E. 先读过刊文献,后读现刊文献

24. 下列有关“理论与概念框架”的描述正确的是
- A. 理论/概念框架在每一份研究报告中都要呈现
  - B. 理论/概念框架可以统领文献知识
  - C. 理论/概念框架具备逻辑性和指导性两个特征
  - D. 理论/概念框架可呈现研究相关概念及概念间的关系
  - E. 理论/概念框架是研究设计的基础
25. 设立对照组的目的是
- A. 排除与研究无关的干扰因素的影响
  - B. 人为施加干预措施
  - C. 突出实验中干预的效应
  - D. 使样本更具代表性
  - E. 使设计内容顺利进行
26. 最为常用的概率抽样方法有
- A. 分层抽样
  - B. 整群抽样
  - C. 系统抽样
  - D. 定额抽样
  - E. 单纯随机抽样
27. 访谈法的缺点包括
- A. 费时
  - B. 花费大
  - C. 应答率低
  - D. 所获资料不完整
  - E. 影响因素较多
28. 某些生理现象无法观察，例如恶心、头晕、乏力等，此时可选择的资料收集方法是
- A. 问卷调查法
  - B. 访谈法
  - C. 电子仪器监测
  - D. 录像法
  - E. 测量法
29. 研究问题可以来自
- A. 临床实践经验
  - B. 研究者的灵感
  - C. 对科研文献的审慎评价
  - D. 弥补文献的缺陷
  - E. 验证未经检验的理论的兴趣
30. 下列对于研究工具的信度和效度的描述，正确的是
- A. 信度是指使用某研究工具所获得结果的一致程度或准确程度
  - B. 效度是指某一研究工具能真正反映它所期望研究的概念的程度
  - C. 信度和效度都要通过具体数值进行描述
  - D. 只要研究工具存在，就会有它的信度和效度
  - E. 信度低的研究工具效度肯定不高
31. 下列有关抽样误差的相关描述，正确的是
- A. 只要是抽样研究，就必然存在抽样误差
  - B. 抽样误差是可以通过一些方法避免的
  - C. 由于总体中各个体之间存在差异导致产生抽样误差
  - D. 选择变异程度大的指标可以减少抽样误差
  - E. 适当的样本量可以减少抽样误差

32. 下列有关统计图的相关描述, 正确的是
- A. 圆图适用于构成比资料
  - B. 直条图可以分为单式直条图和复式直条图
  - C. 统计图的图号和图题写在图的上方
  - D. 纵轴刻度一般以 0 为起始点
  - E. 刻度应均匀等距, 表明数值
33. 《贝尔蒙报告》中所强调的基本伦理原则包括
- A. 公正的原则
  - B. 有益的原则
  - C. 知情同意的原则
  - D. 尊重人尊严的原则
  - E. 评估益处与风险的原则

## 非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上, 不能答在试题卷上。

三、名词解释题: 本大题共 6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分。

- 34. 零次文献
- 35. 表面效度
- 36. 研究设计
- 37. 测量法
- 38. 等级资料
- 39. 护理研究论文

四、简答题: 本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

- 40. 如何根据性质和程度对研究风险进行分类。
- 41. 简述混杂性偏倚的控制方法。
- 42. 简述绘制统计表的注意事项。
- 43. 简述护理综述论文的特征。

五、应用题: 本大题共 1 小题, 10 分。

- 44. 如某护理研究者使用病例对照研究设计, 对已经确诊为 2 型糖尿病 5 年的患者按照已经出现并发症和未出现并发症分为两组, 对这两组患者进行预防并发症的自我护理行为的比较。请回答病例对照研究的概念和这位护理研究者使用这种方法的研究目的。