

全国 2017 年 10 月高等教育自学考试
儿科护理学(二) 试题
课程代码:03011

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 30 小题,每小题 1 分,共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 正常小儿, 身高 75cm、体重 9kg、头围 46cm, 其最可能的年龄是
A. 1 岁
B. 2 岁
C. 3 岁
D. 4 岁
2. 出生时前囟约为 1.5~2cm, 这个长度指的是前囟
A. 对边中点连线的长度
B. 对角线长度
C. 边长
D. 最长径线
3. 按计划免疫程序, 小儿接种麻腮风减毒活疫苗的适宜年龄是
A. 6 个月
B. 8 个月
C. 12 个月
D. 18 个月
4. 母乳中的乙型乳糖可促进肠道中
A. 乳酸杆菌的生长
B. 酵母菌的生长
C. 大肠杆菌的生长
D. 白色念珠菌的生长
5. 32 周早产儿, 生后 5 小时出现呼吸困难, 进行性加重, 呼气时呻吟, 时而发生呼吸暂停, 两肺呼吸音低, 未闻湿啰音。最可能的诊断是
A. 肺部细菌感染
B. 羊水吸入综合征
C. 新生儿湿肺
D. 新生儿肺透明膜病

6. 患儿女, 5 个月, 人工喂养, 今日惊厥 2 次, 每次约半分钟, 急诊入院。查体有颅骨软化。入院后患儿再次惊厥, 此时应首先选择的紧急处理措施是
- A. 给予维生素 D 30 万单位肌内注射 B. 快速静脉注射 10%葡萄糖酸钙
C. 快速静脉注射 20%甘露醇 D. 静脉注射地西洋(安定)
7. 关于急性支气管炎的治疗措施不正确的是
- A. 多饮水, 常变换体位 B. 控制感染
C. 使用镇咳剂 D. 喘憋严重者可可用氨茶碱
8. 患儿男 1 岁半, 夜间睡眠时出现喉鸣和吸气性呼吸困难, 急诊求医, 听诊可闻喉传导音, 心率 150 次/分, 诊断为急性喉炎。患儿喉梗阻的分度应为
- A. I 度 B. II 度
C. III 度 D. IV 度
9. 患儿实施氧疗时, 一般治疗的给氧浓度为
- A. 20%~30% B. 40%~50%
C. 55%~60% D. 65%~70%
10. 缓解哮喘急性症状的首选药物是
- A. 静脉用糖皮质激素 B. 抗胆碱能药物
C. 短效氨茶碱 D. 吸入型速效 β_2 受体激动剂
11. 小儿腹泻出现低渗性脱水, 静脉补充累积损失量时应补充
- A. 1/5 张含钠液 B. 1/3 张含钠液
C. 1/2 张含钠液 D. 2/3 张含钠液
12. 10 个月男婴, 腹泻 2 天, 大便每日 15~18 次, 呈蛋花汤样, 精神萎靡, 眼泪较少, 皮肤弹性差, 口腔粘膜干燥。血清钠为 128mmol/L。该患儿为
- A. 轻度等渗性脱水 B. 中度低渗性脱水
C. 重度等渗性脱水 D. 重度低渗性脱水
13. 关于小儿体液特点描述正确的是, 年龄越小
- A. 体液占体重的比例越高 B. 细胞内液量越多
C. 每日水的交换量相对越少 D. 体液调节能力越强
14. 脉压增大伴有周围血管征的先天性心脏病是
- A. 房间隔缺损 B. 室间隔缺损
C. 动脉导管未闭 D. 肺动脉狭窄
15. 可累及心肌引发心肌炎的最常见病原体是
- A. 流感病毒 B. 呼吸道合胞病毒
C. 轮状病毒 D. 柯萨奇病毒 1~6 型

26. 熟悉各种传染病潜伏期最重要的意义是
- A. 有助诊断
B. 推测预后
C. 确定检疫期
D. 估计病情严重程度
27. 麻疹的主要传播途径是
- A. 呼吸道传播
B. 虫媒传播
C. 血液传播
D. 消化道传播
28. 5岁小儿, 1个月来消瘦, 乏力, 低热。查体: 颈部淋巴结肿大, 肺部无啰音, 肝肋下1cm, 结核菌素试验(++)。胸片: 右肺可见哑铃状双极影。诊断为
- A. 支气管肺炎
B. 粟粒性肺结核
C. 原发型肺结核
D. 支原体肺炎
29. 某一误服巴比妥类药物中毒7小时的患儿, 对其首选的处理方法是
- A. 催吐
B. 洗胃
C. 洗肠
D. 利尿
30. 使用人工呼吸机时, 若患儿吸氧浓度为100%, 其持续时间应为
- A. <6小时
B. 7~8小时
C. 9~10小时
D. 11~12小时

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上, 不能答在试题卷上。

二、填空题: 本大题共10空, 每空1分, 共10分。

31. 小儿3个月能抬头时出现颈椎前凸, 6个月会坐时出现_____, 1岁能行走时出现_____。
32. 低出生体重儿是指出生体重低于_____的新生儿, 体重低于_____的新生儿称极低出生体重儿。
33. 在小儿液体疗法静脉补液过程中需做到“两补”, 即_____、_____。
34. 营养性巨幼红细胞贫血是由于_____或(和)_____缺乏所致的一种大细胞性贫血。
35. 低氧性呼吸衰竭是指在排除发绀型心脏病的前提下, 患儿在吸入氧浓度大于_____ %时, 动脉氧分压小于_____ mmHg。

三、名词解释题：本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分。

- 36. 青春期
- 37. 氧气治疗
- 38. 脱水
- 39. 适中温度（中性温度）
- 40. 口周苍白圈

四、简答题：本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。

- 41. 简述小儿生长发育的规律。
- 42. 简述母乳喂养的优点。
- 43. 简述新生儿 5 种常见特殊生理状态。
- 44. 列出引起哮喘发作的常见病因。
- 45. 简述急性肾小球肾炎患儿饮食管理的要点。

五、论述题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

- 46. 一个 6 个月小儿，身高 65cm，体重 7kg，乳牙 2 颗，一直母乳喂养，未添加辅食，无异常表现。

请根据以上资料回答：

- (1) 列出本阶段小儿应添加的辅食种类。
 - (2) 列出该小儿按计划免疫程序已接种的疫苗名称。
 - (3) 列出本阶段小儿的保健内容。
- 47. 患儿，男，1 岁 1 个月，生后 42 天体检发现心脏杂音，1 年内共患肺炎 3 次。本次因 2 天前开始咳嗽伴发热，1 天来加重入院。查体：T 37.8℃，生长发育落后，两肺布满中、小水泡音及痰鸣音。心率 152 次/分，胸骨左缘 3~4 肋间可闻 III~IV 级粗糙收缩期杂音，伴有震颤，肺动脉第二音亢进，肝肋下 2cm。
- 请根据以上资料回答：
- (1) 该患儿患有哪种先天性心脏病？
 - (2) 本次合并何种疾病？
 - (3) 该患儿主要的护理措施。