

全国 2019 年 10 月高等教育自学考试
儿科护理学(二) 试题
课程代码:03011

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 30 小题,每小题 1 分,共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 反映儿童体格生长和营养状况的敏感指标是

- A. 身高
- B. 体重
- C. 头围
- D. 胸围

2. 小儿前囟闭合的时间为生后

- A. 1~2 个月
- B. 3~4 个月
- C. 8~10 个月
- D. 12~18 个月

3. 一健康小儿,前囟约 2×2 cm,牙齿已萌出,身高 65cm,体重 7.2kg,可独坐片刻,能发辅音,其月龄大约是

- A. 6 个月
- B. 8 个月
- C. 10 个月
- D. 12 个月

4. 婴儿最早添加的辅食应该是

- A. 蛋黄
- B. 米粉
- C. 菜泥
- D. 水果泥

5. 2 岁小儿接种乙脑减毒活疫苗后当晚出现发热,体温 37.9°C ,伴精神弱。此时应采取的措施是

- A. 立即给予退热剂
- B. 立即到医院就诊
- C. 服用抗感冒药物
- D. 休息,多喝水

6. 百白破疫苗的初种年龄是生后
- A. 1 个月
B. 2 个月
C. 3 个月
D. 4 个月
7. Wong-Baker 疼痛评估脸谱表的适用年龄是
- A. 0~1 岁
B. 1~2 岁
C. 2~3 岁
D. 3 岁以上
8. 新生儿硬肿的首发部位是
- A. 面颊
B. 上肢
C. 臀部
D. 下肢外侧
9. 新生儿肺透明膜病的主要病因是
- A. 产后感染
B. 产时窒息
C. 原发性肺不张
D. 缺乏肺泡表面活性物质
10. 患儿男, 7 个月, 诊断为维生素 D 缺乏性佝偻病, 此时患儿的骨骼改变可能出现
- A. 方颅
B. 肋缘外翻
C. 脊柱侧弯
D. “O”型腿
11. 患儿男, 2 岁, 咳嗽 3 天, 体温 38℃, 双肺可闻及干性及不固定湿啰音, 应首先考虑的诊断是
- A. 支气管肺炎
B. 急性支气管炎
C. 支气管异物
D. 急性上呼吸道感染
12. 将 200ml 生理盐水和 100ml 1.4%NaHCO₃ 溶液混合, 其混合液的张力为
- A. 等张
B. 2/3 张
C. 1/2 张
D. 1/3 张
13. 患儿, 10 个月, 腹泻 2 天, 精神萎靡, 皮肤弹性差, 前囟凹陷, 口腔黏膜干燥, 尿量较少。判断该患儿脱水程度为
- A. 轻度
B. 中度
C. 重度
D. 极重度
14. 患儿女, 2 岁, 腹泻补液后脱水基本纠正, 但精神弱、四肢无力、腱反射减弱、心音低钝。考虑该患儿可能发生了
- A. 低钾血症
B. 低钙血症
C. 低镁血症
D. 低血糖

23. 出生时即存在且维持终生的神经反射是
- A. 腹壁反射
B. 提睾反射
C. 角膜反射
D. 拥抱反射
24. 川崎病的特征性临床表现是
- A. 皮疹
B. 指端膜样脱屑
C. 发热
D. 眼球结膜充血
25. 先天性甲状腺功能减退症患儿给予甲状腺素片治疗, 应维持至
- A. 终生治疗
B. T4 和 TSH 正常后停药
C. 青春期停药
D. 症状控制即可停药
26. 患儿女, 10 个月, 结核菌素试验 (+++), 最有可能的是
- A. 母亲有结核病
B. 曾患过结核病
C. 体内有活动性结核灶
D. 出生时接种过卡介苗
27. 接触水痘的易感儿检疫期应为
- A. 5 天
B. 7 天
C. 14 天
D. 21 天
28. 早期发现麻疹最有价值的依据是
- A. 呼吸道卡他症状
B. 躯干有皮疹
C. 颈部淋巴结肿大
D. 麻疹黏膜斑
29. 患儿因颅内出血入院, 已出现脑疝前驱症状, 应采取的体位是
- A. 平卧
B. 头部抬高 $5^{\circ} \sim 10^{\circ}$
C. 头部抬高 $15^{\circ} \sim 20^{\circ}$
D. 头部抬高 $25^{\circ} \sim 30^{\circ}$
30. 患儿皮肤接触毒鼠药中毒, 宜选取的冲洗液是
- A. 清水
B. 食用醋
C. 肥皂水
D. 10%碳酸氢钠

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

二、填空题:本大题共 10 空,每空 1 分,共 10 分。

31. 正常小儿会爬行的月龄是_____个月。
32. 新生儿从母体通过胎盘获得的免疫球蛋白是_____。
33. 急性感染性喉炎以_____、声嘶、喉鸣和_____为临床特征。
34. 小儿轻型腹泻以_____症状为主,无_____和全身中毒症状。
35. 心力衰竭患儿每次应用洋地黄前应测量_____。
36. 急性肾小球肾炎最早出现的症状是_____和_____。
37. 脉压增大伴有周围血管征的先天性心脏病是_____。

三、名词解释题:本大题共 5 小题,每小题 3 分,共 15 分。

38. 学龄期
39. 人工被动免疫
40. 治疗性的游戏
41. 早产儿
42. 贫血

四、简答题:本大题共 5 小题,每小题 5 分,共 25 分。

43. 简述光照疗法的护理常规。
44. 简述单纯性肥胖小儿饮食管理措施。
45. 简述法洛四联症患儿缺氧发作时的处理措施。
46. 简述小儿营养性缺铁性贫血的原因。
47. 简述过敏性紫癜患儿腹痛的护理要点。

五、论述题:本大题共 2 小题,每小题 10 分,共 20 分。

48. 患儿女,9 个月,发热、咳嗽 2 天,今日哭闹烦躁,咳嗽加重、痰多就诊。查体:体温 38.9℃,心率 182 次/分,呼吸 65 次/分。面色苍白,呼吸急促、可见鼻翼扇动及三凹征,口周发绀,双肺可闻及哮鸣音及细湿啰音,心音低钝,肝肋下 3.5cm。血常规 $WBC 11 \times 10^9/L$,胸片可见右下肺片状阴影。

请根据以上资料回答:

- (1) 该患儿最可能的临床诊断。
- (2) 该患儿 3 个主要护理问题。
- (3) 该患儿主要护理措施。

49. 患儿男，8岁，2周前无明显诱因出现多饮、多尿，尿量达3000~4000ml/d。食欲稍有增加，容易饥饿，发病以来无其它异常，体重减轻约1.5kg。入院实验室检查：尿葡萄糖(+++)，尿酮体(+);空腹血糖11mmol/L，餐后2小时血糖15mmol/L，糖化血红蛋白12.1%;抗谷氨酸抗体阳性。临床诊断为1型糖尿病，入院后给予胰岛素注射治疗。

请根据以上资料回答：

- (1) 患儿饮食管理的原则。
- (2) 胰岛素的使用方法。