

# 全国 2021 年 10 月高等教育自学考试

## 儿科护理学(二)试题

课程代码:03011

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。
2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

### 选择题部分

#### 注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

**一、单项选择题:** 本大题共 30 小题, 每小题 1 分, 共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的, 请将其选出。

1. 符合 6 个月婴儿动作发育的是
  - 会爬
  - 能坐片刻
  - 直立时能抬头
  - 扶腋下能站直
2. 健康女孩, 体重 18kg, 身长 107cm, 其年龄约为
  - 2 岁
  - 3 岁
  - 4 岁
  - 5 岁
3. 按计划免疫程序, 小儿接种麻风减毒活疫苗的适宜月龄是
  - 3 个月
  - 6 个月
  - 8 个月
  - 12 个月
4. 最常用的小儿药物剂量计算方法是
  - 按年龄计算
  - 按体重计算
  - 按体表面积计算
  - 按成人剂量折算
5. 适合 7~9 个月婴儿添加的辅食是
  - 豆制品
  - 肝泥
  - 面条
  - 碎肉

6. 小儿禁用肾上腺皮质激素的疾病是  
A. 肾病综合征      B. 哮喘  
C. 过敏性紫癜      D. 水痘
7. 正在断奶的婴儿在住院期间应该  
A. 继续母乳喂养      B. 继续断奶  
C. 以牛乳代替母乳      D. 以配方奶代替母乳
8. 符合早产儿外观特点的是  
A. 鬃毛多      B. 乳晕清楚  
C. 足底纹理清晰      D. 指甲达指端
9. 正常足月儿生理性黄疸自然消退的时间是生后  
A. 4~5 天      B. 5~7 天  
C. 10~14 天      D. 15~20 天
10. 新生儿肺透明膜病开始出现呼吸困难的时间是生后  
A. 6h 内      B. 12h 内  
C. 18h 内      D. 24h 内
11. 患儿女，10 个月，诊断为维生素 D 缺乏性佝偻病。骨样组织堆积的表现是  
A. 肋骨串珠      B. 肋缘外翻  
C. 鸡胸      D. “O”型腿
12. 缓解支气管哮喘急性发作的首选药物是  
A. 氨茶碱      B. 孟鲁司特  
C. 阿奇霉素      D. 沙丁胺醇
13. 患儿男，1 岁，因咳嗽痰多给予雾化吸入治疗，每次雾化吸入的时间不宜超过  
A. 10 分钟      B. 20 分钟  
C. 30 分钟      D. 40 分钟
14. 婴幼儿腹泻时发生酸碱平衡紊乱最常见的类型是  
A. 代谢性酸中毒      B. 代谢性碱中毒  
C. 呼吸性酸中毒      D. 呼吸性碱中毒
15. 3 个月婴儿的胃容量约是  
A. 30~60ml      B. 60~90ml  
C. 90~150ml      D. 200~250ml

16. 婴幼儿腹泻伴中度脱水其失水量约为体重的  
A. <5% B. 5%~10%  
C. 10%~15% D. ≥15%

17. 无分流型的先天性心脏病是  
A. 动脉导管未闭 B. 室间隔缺损  
C. 肺动脉狭窄 D. 法洛四联症

18. 特发性血小板减少性紫癜最突出的临床表现是  
A. 自发性皮肤和黏膜出血 B. 出血点分布均匀  
C. 呕血和黑便 D. 出血点以躯干为主

19. 小儿急性白血病最常见最危险的并发症是  
A. 高尿酸血症 B. 损伤  
C. 心力衰竭 D. 感染

20. 6个月~6岁小儿贫血诊断标准是血红蛋白低于  
A. 90g/L B. 100g/L  
C. 110g/L D. 120g/L

21. 患儿男，7岁，眼睑及双下肢浮肿5天，逐渐加重并出现阴囊肿大。尿蛋白(++++)，血浆总蛋白40g/L，白蛋白15g/L，球蛋白20g/L，总胆固醇6.4mmol/L，治疗该病首选的药物是  
A. 白蛋白 B. 青霉素  
C. 利尿剂 D. 肾上腺皮质激素

22. 患儿男，8岁，眼睑浮肿4天伴少尿，尿呈浓茶色，目前患儿的尿量每日300ml，此时应  
A. 限制钠盐摄入 B. 增加水摄入  
C. 限制蛋白质摄入 D. 正常饮食

23. 急性感染性多发性神经根神经炎弛缓性瘫痪最先出现于  
A. 上肢肌肉 B. 腰背肌  
C. 下肢肌肉 D. 呼吸肌

24. 川崎病最早出现的症状是  
A. 手足硬性水肿 B. 皮疹  
C. 杨梅舌 D. 发热

25. 患儿男，1岁半，表情呆滞，眼睑浮肿，鼻梁低，舌宽大并常伸出口外，皮肤苍黄、粗糙，四肢粗短，腹部膨隆，腱反射减弱，血清  $T_4$  下降，TSH 增高，最可能的诊断是  
A. 21三体综合征      B. 先天性甲状腺功能减退症  
C. 苯丙酮尿症      D. 维生素D缺乏性佝偻病
26. 患儿女，9岁，主因多饮、多尿、多食、消瘦就诊，通过辅助检查确诊为I型糖尿病，未遵医嘱治疗，出现食欲减退、恶心呕吐、腹痛、皮肤黏膜干燥、呼吸深长可闻及烂苹果味，首先考虑的并发症是  
A. 急性腹膜炎      B. 急性胰腺炎  
C. 坏死性小肠结肠炎      D. 酮症酸中毒
27. 水痘患儿应隔离至  
A. 出疹后10天      B. 出疹后21天  
C. 体温正常后      D. 疱疹全部结痂
28. 猩红热易出现的并发症是  
A. 支气管肺炎      B. 急性胰腺炎  
C. 化脓性脑膜炎      D. 急性肾小球肾炎
29. 急性颅内压升高患儿出现脑疝时应采取的体位  
A. 头部抬高  $20^\circ$       B. 平卧位  
C. 侧卧位      D. 俯卧位
30. 小儿误服强酸中毒后，选用的中和剂不包括  
A. 氢氧化铝凝胶      B. 碳酸氢钠  
C. 牛乳      D. 蛋清

## 非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

**二、填空题：本大题共 10 空，每空 1 分，共 10 分。**

31. 退热药物\_\_\_\_\_个月以下婴儿慎用，尽量采用物理方法降温。
32. 早产儿用氧浓度过高，时间过长可引起\_\_\_\_\_，造成失明。
33. 小儿氧气治疗的适应证为动脉血氧分压低于\_\_\_\_\_和患者出现发绀表现。
34. 静脉补液实施的过程中需做到三定，即\_\_\_\_\_、定性、\_\_\_\_\_。
35. 按照儿童糖尿病饮食管理要求，早、中、晚三餐热量分别占比\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。
36. 预防小儿结核病的方法是控制传染源，\_\_\_\_\_和预防性化疗。
37. 脑复苏常用的方法有氧疗、\_\_\_\_\_、降低颅内压。

**三、名词解释题：本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分。**

38. 大于胎龄儿
39. 枕秃
40. 脱水
41. 麻疹黏膜斑
42. 呼吸衰竭

**四、简答题：本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。**

43. 简述癌症患儿疼痛的药物性干预原则。
44. 简述急性泌尿系感染患儿的护理要点。
45. 简述单纯性肥胖患儿饮食管理的指导内容。
46. 简述母乳喂养的优点。
47. 简述小儿肺炎合并心力衰竭的临床表现。

**五、论述题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。**

48. 论述小儿语言发展的规律。

49. 患儿男，10个月，因“发热、呕吐2天伴惊厥2次”收入院。入院查体：T39℃，P130次/分，嗜睡，前囟1.2cm，略紧张膨隆；听诊双肺少许细湿啰音；颈无抵抗；巴氏征（+）。血常规检查：WBC $17\times 10^9/L$ , N86%, L14%；脑脊液检查：外观混浊，压力明显增高，白细胞 $800\times 10^6/L$ ，蛋白质2g/L，糖2.3mmol/L，氯化物105mmol/L。目前给予抗生素和甘露醇治疗。

请根据以上资料回答：

- (1) 该患儿的临床诊断。
- (2) 列出主要护理问题。（写出3个）
- (3) 列出主要护理措施。