

2022 年 10 月高等教育自学考试
内科护理学(二)试题
课程代码:03202

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。
2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题: 本大题共 15 小题, 每小题 1 分, 共 15 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的, 请将其选出。

1. 肺内与临近的毛细血管内皮细胞紧密相贴, 构成气血屏障的细胞是
 - A. I 型肺泡上皮细胞
 - B. II 型肺泡上皮细胞
 - C. 肺泡巨噬细胞
 - D. 肺泡间质细胞
2. 对慢性阻塞性肺疾病 (COPD) 的诊断、严重程度评价、疾病进展、预后及治疗具有重要意义的一项检查是
 - A. 肺功能检查
 - B. 胸部 X 线检查
 - C. 动脉血气分析
 - D. 痰培养
3. 患者, 男性, 24 岁, 患支气管哮喘多年。1 小时前接触朋友的宠物后, 出现喘息、咳嗽。此时应当首选的措施是
 - A. 吸氧
 - B. 平卧休息
 - C. 吸入短效β₂受体激动剂
 - D. 吸入长效β₂受体激动剂
4. 患者, 女性, 75 岁。主因“慢性心力衰竭, 急性加重”急诊入院。患者端坐呼吸, 大汗淋漓, 极度烦躁不安, 诉喘憋, 根据 NYHA 分级, 其目前的心功能属于
 - A. I 级
 - B. II 级
 - C. III 级
 - D. IV 级

5. 对于合并糖尿病或肾病的高血压患者，其降压目标是
- A. <150/90mmHg B. <140/90mmHg
C. <140/80mmHg D. <130/80mmHg
6. 对就诊较晚的急性胰腺炎患者，具有诊断价值的检查项目是
- A. 血清淀粉酶 B. 血清脂肪酶
C. 尿淀粉酶 D. 尿脂肪酶
7. 患者，男性，45岁，患乙肝后肝硬化多年，1年前曾呕血一次。2小时前再次呕血，为鲜红色，共呕血3次，随后晕厥倒地，家属送至急诊。查体：BP 80/40mmHg，P 120次/分，呼之不应，四肢湿冷。则估计该患者的消化道出血量约为
- A. 100~200ml B. 250~400ml
C. 500~600ml D. >1000ml
8. 患者，男性，68岁，因急性肾衰竭入院，查血钾6.8mmol/L。下列措施中最有效降低血钾的是
- A. 静脉注射10%葡萄糖酸钙20ml
B. 口服离子交换树脂
C. 血液透析
D. 50%葡萄糖50ml+普通胰岛素10IU静脉注射
9. 患者，女性，39岁，因急性白血病采取化疗药物治疗，因环磷酰胺导致的毒副作用中，一旦出现需立即停药的症状是
- A. 脱发 B. 血尿
C. 恶心呕吐 D. 手足麻木
10. 患者，男性，72岁，确诊为2型糖尿病8年。口服降糖药物加胰岛素治疗3个月后，为了解强化降糖治疗期间血糖控制的总体情况，应选择的检查是
- A. 24h血糖监测 B. 24h尿糖监测
C. 糖化血红蛋白测定 D. 葡萄糖耐量试验
11. 患者，女性，31岁，确诊系统性红斑狼疮3年。1周前无诱因关节疼痛加重入院治疗，护士对其休息与活动的指导，正确的是
- A. 绝对卧床休息 B. 卧床休息保持关节功能位
C. 适当室内及床边活动 D. 无活动限制，避免劳累
12. 患者，女性，28岁。因沐浴时吸入大量燃气致昏迷，以急性一氧化碳中毒急诊入院。入院后该患者宜立即接受的最佳治疗措施是
- A. 利尿脱水 B. 血液灌流
C. 血液透析 D. 高压氧治疗
13. 肾综合征出血热的主要传染源是
- A. 猪 B. 蚊子
C. 鼠 D. 苍蝇

14. 霍乱的主要传染源是患者及
A. 带菌者 B. 隐性感染者
C. 受感染的动物 D. 潜伏性感染者
15. 确诊脑出血的首选检查是
A. 头颅 CT B. 头颅 MRI
C. 脑血管造影 D. 脑脊液检查
- 二、多项选择题：本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。在每小题列出的备选项中至少有两项是符合题目要求的，请将其选出，错选、多选或少选均无分。
16. 护士对支气管哮喘使用定量雾化吸入器（MDI）的指导下，正确的有
A. 吸药前摇匀药液 B. 快速呼气至不能再呼（RV 位）
C. 喷嘴放入口中，经口吸气 D. 深吸气后按压驱动装置
E. 吸入药液后屏气 10 秒
17. 对涂阳的肺结核患者应当进行呼吸道隔离。下列措施中正确的隔离措施有
A. 患者咳嗽时用手肘遮掩口鼻 B. 痰液吐入纸巾直接焚烧
C. 接触痰液后用流动水清洗双手 D. 餐具、衣物和寝具暴晒消毒
E. 室内保持良好通风
18. 建立人工气道的患者应当适时进行经人工气道吸痰。下列表现中，提示护士应当为患者进行吸痰的有
A. 患者躁动不安 B. 双肺可闻及痰鸣音
C. 心率突然升高 D. 气道压力突然上升
E. SpO₂ 突然下降
19. 下列因素中，冠心病的易患因素（危险因素）有
A. 劳累 B. 高血压
C. 饮酒 D. 高血脂症
E. 糖尿病
20. 病毒性心肌炎的治疗目的在于
A. 降低病毒载量 B. 控制血压
C. 减轻心脏负荷 D. 控制心律失常
E. 防治心力衰竭
21. 患者，男性，60岁，因肝硬化入院。入院当晚出现烦躁不安，胡言乱语。为缓解患者的躁动，可以使用的药物有
A. 吗啡 B. 半量安定
C. 水合氯醛 D. 东莨菪碱
E. 异丙嗪

22. 患者，女性，60岁，因“发热伴尿急、尿痛2天”就诊，查血常规显示Hb120g/L，WBC $12.3 \times 10^9/L$ ，PLT $35 \times 10^9/L$ ，尿WBC满视野，确诊为急性肾盂肾炎。既往高血压10年，糖尿病8年。则该患者患肾盂肾炎的易感因素有
A. 发热 B. 血WBC升高
C. 女性 D. 高血压
E. 糖尿病
23. 与特发性血小板减少性紫癜发病相关的因素有
A. 免疫因素 B. 肝脾因素
C. 感染因素 D. 环境因素
E. 药物因素
24. 类风湿关节炎患者颈椎骨突关节的类风湿病变导致脊髓受压时，临床表现包括
A. 渐起的双手感觉异常和力量减弱 B. 腕管综合征
C. 单个或多个肢体局部感觉缺失 D. 腱反射亢进和病理反射阳性
E. 垂腕症、垂足症
25. 帕金森病震颤的特点有
A. 随意性 B. 节律性
C. 静止性 D. 强直性
E. 紧张性

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

三、填空题：本大题共20空，每空1分，共20分。

26. 吸烟是COPD重要的危险因素，烟草中的焦油、_____和氢氰酸等化学物质可损伤气道上皮细胞，使纤毛运动障碍和巨噬细胞吞噬功能降低。
27. COPD患者进行长期家庭氧疗(LTOT)的目标是使PaO₂在60~65mmHg之间和(或)SaO₂>_____%。
28. 支气管哮喘的典型体征是呼气相延长伴广泛的_____音。
29. 居社区获得性肺炎首位的是由_____感染引起的肺炎。
30. 一般将24小时内咯血量在500ml以上或一次_____ml以上定为大量咯血。
31. 急性心力衰竭治疗中应用血管扩张剂时应控制输液速度并监测_____。
32. 心房扑动的临床症状取决于_____的快慢。
33. 心绞痛发作时可出现一过性心肌缺血性的ST段下移和/或_____倒置。
34. 在我国_____系统疾病是急性胰腺炎最常见的原因。

35. 呕血多呈_____色，这与血液经胃酸作用形成正铁血红素有关。
36. 肾脏可分泌多种内分泌激素，其中可促进骨髓红细胞集落形成单位分化成熟为红细胞的是_____。
37. 使用糖皮质激素治疗肾病综合征应当遵循的原则是：_____要足，减撤药要慢，维持用药要久。
38. 再生障碍性贫血主要表现为进行性贫血、出血、感染及外周血中_____减少。
39. 胃大部切除或胃—空肠吻合术后患者缺铁性贫血的主要原因是_____。
40. 糖尿病所致大血管病变的基本病理改变是_____。
41. 系统性红斑狼疮患者应用环磷酰胺治疗时，白细胞低于 $3\times 10^9/L$ ，应_____使用。
42. 干燥综合征患者特征性的皮肤表现为_____样皮疹，多见于下肢。
43. 有机磷农药轻度中毒患者临床表现以_____症状为主。
44. 甲型肝炎和戊型肝炎的传染源是急性患者和_____。
45. 引起艾滋病的主要毒株是 HIV-1，其主要感染 CD4⁺_____细胞。

四、名词解释题：本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分。

46. 医院获得性肺炎
47. 心律失常
48. 肝性脑病
49. 弥散性血管内凝血
50. 癫痫

五、简答题：本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

51. 简述肺心病患者进行全身锻炼时的注意事项。
52. 简述慢性肾小球肾炎患者健康教育的内容。
53. 简述糖尿病患者饮食治疗的目的和原则。
54. 简述急性镇静催眠药中毒患者的病情监测指标。

六、论述题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

55. 患者，男性，76岁。3年来快步行走时出现心悸、气短，休息后可缓解，日常生活无受限。近3个月，自觉体力明显下降，散步行走100米左右即感觉心悸、气短，夜间多次在睡眠中憋醒，伴咳嗽、咳痰，坐起后可缓解，自述生活自理能力明显下降。近一个月夜间不能平卧，尿量减少，下肢水肿。3天前因感冒出现发热、心悸、呼吸困难加重，体力活动受限明显，洗漱、穿衣等活动后即感觉气短，急诊以“慢性心力衰竭，全心衰竭”收入院。患者3年前曾因急性心肌梗死入院，拒绝PCI治疗，予药物治疗后好转出院。发现高血压20余年，糖尿病史8年。

查体：T 36.9℃，R 22 次/分，P 76 次/分，BP 100/75mmHg，高枕卧位，口唇轻度发绀，颈静脉充盈明显，双肺底可闻及湿啰音，心率 98 次/分，心音低钝，心律绝对不齐，叩诊心界向左扩大，腹软，肝肋下 1cm，双下肢可凹性水肿。ECG 示：心房颤动。

请写出：

- (1) 该患者符合“慢性心力衰竭，全心衰竭”诊断的临床表现；
- (2) 该患者此次发病的诱因；
- (3) 该患者目前的心功能分级及依据；
- (4) 护士对该患者休息与活动的指导内容。

56. 患者，男性，38岁，某公司高管。近半年来工作压力大，经常加班至深夜，常在加班时感到上腹疼痛，饥饿样感觉，伴嗳气、反酸，适当进食后可缓解。2周前自觉腹痛加重，为治疗来院就诊。

查体：T 36.8℃，P 80 次/分，R 16 次/分，BP 110/70mmHg，神清语利，心肺（-），腹软，剑突下压痛、无反跳痛，肠鸣音 4~6 次/分。

辅助检查：Hb 140g/L，WBC $8 \times 10^9/L$ ，PLT $30 \times 10^9/L$ 。胃镜检查显示，十二指肠球部可见一 $1.2 \times 1.2\text{cm}$ 溃疡灶，底覆白苔，周边黏膜充血水肿。快速尿素酶试验（+）。初步诊断为“十二指肠球溃疡”，给予兰索拉唑、胶体次枸橼酸铋、阿莫西林和克拉霉素治疗。

请回答：

- (1) 快速尿素酶试验（+）的临床意义；
- (2) 兰索拉唑治疗消化性溃疡的机制；
- (3) 胶体次枸橼酸铋的用药护理内容；
- (4) 该患者进食方式的护理原则。