

2023 年 4 月高等教育自学考试  
内科护理学(二) 试题  
课程代码:03202

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。
2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 15 小题,每小题 1 分,共 15 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 缺氧对呼吸的兴奋作用是通过
  - A. 外周压力感受器实现
  - B. 中枢压力感受器实现
  - C. 外周化学感受器实现
  - D. 中枢化学感受器实现
2. 肺炎患者出现胸痛时,应采取的体位是
  - A. 患侧卧位
  - B. 健侧卧位
  - C. 仰卧位
  - D. 俯卧位
3. 下列慢性心力衰竭治疗药物中,用以减轻心脏负荷的是
  - A. 地高辛
  - B. 多巴胺
  - C. 硝普钠
  - D. 比索洛尔
4. 患者,男性,67 岁,反复发作一时性晕厥伴胸闷、乏力,心电图诊断为二度 II 型房室传导阻滞,该患者首选的治疗是
  - A. 刺激迷走神经
  - B. 安装永久起搏器
  - C. 静注异丙肾上腺素
  - D. 静注阿托品
5. 患者,男性,71 岁,因“间断胸痛 2 年,加重 6 小时”急诊以“急性心肌梗死”收入院,医嘱予 24 小时心电监护,在该患者发病 24 小时内最多见的心律失常类型是
  - A. 窦性心动过缓
  - B. 窦性心动过速
  - C. 房室传导阻滞
  - D. 室性期前收缩

6. 患者，男性，22岁，因“消化性溃疡”入院，幽门螺杆菌(+)，经治疗后病情好转。护士指导其根除幽门螺杆菌治疗后，复查时应首选的检查是
- A. 快速尿素酶试验  
B. 幽门螺杆菌抗体检测  
C.  $^{13}\text{C}$  或  $^{14}\text{C}$  呼气试验  
D. 粪便幽门螺杆菌抗原检测
7. 患者，男性，45岁。患溃疡性结肠炎多年，近半年自觉病情好转，未规律用药。2天前腹泻加重，伴呕吐、腹胀明显。查体腹部膨隆，可见胃肠型，压痛(+)，反跳痛(-)，肠鸣音消失。该患者最可能出现的并发症是
- A. 中毒性巨结肠  
B. 绞窄性肠梗阻  
C. 结肠癌变  
D. 结肠大出血
8. 目前认为，对于诊断早期肝性脑病包括亚临床脑病最有效的检查是
- A. 血氨水平  
B. 脑电图检查  
C. 脑诱发电位检查  
D. 心理智能测验
9. 慢性肾衰竭患者最常见的电解质紊乱是
- A. 高钾血症  
B. 高钙血症  
C. 低镁血症  
D. 低磷血症
10. 患者，男性，66岁，因慢性肾功能衰竭进行血液透析治疗。在透析过程中，患者出现面色苍白、出汗、恶心等表现。护士应考虑该患者出现的并发症是
- A. 失衡综合征  
B. 低血压  
C. 致热原反应  
D. 感染
11. 甲状腺危象的治疗中，为抑制甲状腺激素合成及  $\text{T}_4$  转变为  $\text{T}_3$ ，应首选
- A. 丙基硫氧嘧啶  
B. 碘化钠  
C. 糖皮质激素  
D.  $\beta$  受体阻滞剂
12. 糖尿病发生微血管病变可引起
- A. 冠心病  
B. 肾动脉硬化  
C. 糖尿病肾病  
D. 肢体动脉硬化
13. 导致肾综合征出血热的病原是
- A. HBV  
B. 埃博拉病毒  
C. HCV  
D. 汉坦病毒
14. 应按照甲类传染病管理及对患者施行严密隔离的疾病是
- A. 狂犬病  
B. 霍乱  
C. 艾滋病  
D. 肝炎
15. 脑栓塞最常见的病因是
- A. 寄生虫卵  
B. 脂肪栓子  
C. 空气栓子  
D. 心源性栓子

二、多项选择题：本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。在每小题列出的备选项中至少有两项是符合题目要求的，请将其选出，错选、多选或少选均无分。

16. 护士指导肺炎患者留取合格痰标本，下列指导中正确的有
- A. 留取晨起第一口痰
  - B. 双氧水漱口 3 次
  - C. 用力咳出深部痰液
  - D. 送检时间不超过 2 小时
  - E. 无痰者可暂不留取标本
17. 护士对慢性肺源性心脏病患者进行的运动指导中，正确的有
- A. 活动前后应充分休息
  - B. 尽量在止喘药发挥最大作用时活动
  - C. 活动强度以运动后 30 分钟内呼吸恢复至运动前水平为宜
  - D. 街舞、杠铃等是较为适宜的运动形式
  - E. 有条件的应进行运动氧疗
18. 慢性左心衰竭患者可表现为
- A. 咳嗽、咯痰
  - B. 颈静脉怒张
  - C. 夜间阵发性呼吸困难
  - D. 上腹胀满、食欲不振
  - E. 肝脏肿大
19. 关于房颤治疗的描述，正确的有
- A. 持续房颤转复心律首选索他洛尔
  - B. 药物无效时应及时选用非同步电复律
  - C. 永久性房颤可应用洋地黄控制心室率
  - D. 射频消融术是房颤治疗的有效方法
  - E. 永久性房颤应长期接受华法林抗凝治疗
20. 高血压病的非药物治疗包括
- A. 限制钠摄入
  - B. 减轻体重
  - C. 适量运动
  - D. 戒烟
  - E. 戒酒
21. 下列因素中，可诱发肝性脑病的有
- A. 上消化道出血
  - B. 大量放腹水
  - C. 高纤维素饮食
  - D. 高蛋白饮食
  - E. 感染
22. 下列临床表现和实验室检查中，提示可能为重症胰腺炎的有
- A. 发热
  - B. 血钙降低
  - C. 腹痛
  - D. 血糖降低
  - E. 脐周皮肤瘀斑

23. 肾病综合征患者采用糖皮质激素治疗, 护士向患者解释激素治疗应遵循的原则和方法中, 正确的有
- A. 小剂量开始  
B. 减撤药要慢  
C. 维持用药要久  
D. 可联合使用两种糖皮质激素类药物  
E. 一天的剂量宜在早晨 8 点顿服
24. 糖尿病患者血脂紊乱的典型表现包括
- A. 低密度脂蛋白降低  
B. 甘油三酯升高  
C. 低密度脂蛋白升高  
D. 高密度脂蛋白升高  
E. 高密度脂蛋白降低
25. 霍乱患者在脱水虚脱期可表现为
- A. 剧烈腹泻  
B. 喷射性呕吐  
C. 脱水  
D. 循环衰竭  
E. 电解质紊乱及代谢性酸中毒

## 非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上, 不能答在试题卷上。

三、填空题: 本大题共 20 空, 每空 1 分, 共 20 分。

26. 肺结核的主要传染源是\_\_\_\_\_的肺结核患者。
27. 肺血栓栓塞症溶栓治疗的主要并发症为\_\_\_\_\_。
28. 用脉搏血氧仪经皮测得的\_\_\_\_\_可用于评价氧合功能, 大于 94%为正常, 小于 90%提示低氧血症。
29. 心脏传导系统的细胞均能发出冲动, 但以\_\_\_\_\_的自律性最高。
30. 急性左心衰竭患者应采取坐位, 两腿下垂, 以\_\_\_\_\_静脉回流。
31. 心房颤动患者听诊第一心音强弱不等, 心室律\_\_\_\_\_, 有脉短绌。
32. 安装永久起搏器后患者应避免剧烈运动, 以防\_\_\_\_\_移位或脱落。
33. 引起急性病毒性心肌炎最常见的病毒是\_\_\_\_\_病毒。
34. 穿孔是消化性溃疡常见的并发症之一, 最常发生于\_\_\_\_\_溃疡。
35. 溃疡性结肠炎一般首选\_\_\_\_\_治疗, 因其可经肠菌分解为 5-氨基水杨酸和磺胺吡啶, 前者为主要的有效成分。
36. 急性胰腺炎治疗的目标是抑制\_\_\_\_\_分泌, 抑制胰酶活性及减少并发症的发生。
37. 上消化道大出血使用抑制胃酸分泌药物, 可提高胃内\_\_\_\_\_值, 有促进止血作用。
38. 慢性肾小球肾炎患者 24 小时尿蛋白定量多在\_\_\_\_\_ g/d。
39. 急性肾衰竭患者出现进行性\_\_\_\_\_增多是肾功能开始恢复的标志。

40. 胰腺胰岛 B 细胞分泌的\_\_\_\_\_是促进细胞摄取和利用葡萄糖,从而降低血糖的主要激素。
41. 目前认为 Graves 病属\_\_\_\_\_性甲状腺病,发病个体具有遗传易感性。
42. 糖尿病患者三餐热量分配可根据饮食习惯,选择 1/3、1/3、1/3 或\_\_\_\_\_均可。
43. 类风湿关节炎发生的关节肿胀主要累及小关节,尤其是\_\_\_\_\_关节的对称性多关节炎。
44. 系统性红斑狼疮患者最具特征性的皮疹为双面颊和鼻梁部位的\_\_\_\_\_。
45. 艾滋病潜伏期较长,可达 2 年~\_\_\_\_\_年。

四、名词解释题:本大题共 5 小题,每小题 3 分,共 15 分。

46. 支气管哮喘
47. 急性心力衰竭
48. 甲状腺功能减退症
49. 系统性红斑狼疮
50. 中毒

五、简答题:本大题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分。

51. 简述慢性心衰患者使用利尿剂治疗的药物护理要点。
52. 简述肝硬化患者的饮食护理要点。
53. 简述肾盂肾炎患者健康教育的主要内容。
54. 简述急性中毒昏迷患者病情观察的要点。

六、论述题:本大题共 2 小题,每小题 10 分,共 20 分。

55. 患者,男性,65 岁。近 5 年来常于晨起出现咳嗽、咳白色粘痰,冬春交季时咳嗽较为明显。近半年来自觉体力下降,爬 2~3 层楼即出现喘息、气短,咳嗽咳痰亦较前加重,痰量增多,日常生活尚能自理。为进一步治疗来我院就诊。既往吸烟 40 余年,每日 30~40 支,饮酒 30 余年,啤酒 200ml/天,否认心脑血管疾病、糖尿病等疾病。

查体:BP 130/80mmHg, R 20 次/分,桶状胸、肋间隙增宽,双肺呼吸音粗,未闻及干湿啰音,HR 88 次/分,律齐,各瓣膜听诊区未闻及杂音,余(—)。

化验检查:血 WBC  $8 \times 10^9/L$ , Neut 65%, Hb 130g/L; AST 20U/L, Scr  $87 \mu\text{mol/L}$ ; 血气分析示 pH 7.36, PaO<sub>2</sub> 62mmHg, PaCO<sub>2</sub> 45mmHg。

肺功能:FEV<sub>1</sub>/FVC=59.57%, FEV<sub>1</sub>实际/预测=70.8%, TLC 实际/预测=164.3%。

胸片:双肺纹理增粗。

诊断为“慢性阻塞性肺疾病”,给予茶碱口服治疗。

请写出：

- (1) 该患者诊断为“慢性阻塞性肺疾病”的诊断依据；
- (2) 医嘱患者进行长期家庭氧疗，护士指导患者应采取的氧流量和吸氧时间；
- (3) 护士指导患者进行缩唇腹式呼吸的原理和方法。

56. 患者，男性，36岁，半年前无诱因开始头晕、乏力，间断出现下肢皮肤出血点，刷牙出血，服用中药治疗未见好转，近一周来上述症状加重，为求进一步诊治入院。患者既往体健，病后无鼻出血和黑便，二便正常。

查体：T 36.0℃，P 100次/分，R 20次/分，BP 120/70mmHg，贫血貌，双下肢散在出血点，浅表淋巴结未触及，胸骨无压痛，心肺无异常，肝脾未触及。

化验检查：RBC  $1.5 \times 10^{12}/L$ ，WBC  $3.0 \times 10^9/L$ ，PLT  $35 \times 10^9/L$ ，Hb 45g/L。

入院后为明确诊断行骨髓穿刺检查后诊断为“慢性再生障碍性贫血”，医嘱予丙酸睾丸酮 100mg，Qd，肌肉注射。

请写出：

- (1) 该患者诊断为“慢性再生障碍性贫血”的主要依据；
- (2) 该患者骨髓象表现特点；
- (3) 丙酸睾丸酮治疗的主要护理措施。